

Rocuronium Bromide 50 mg/5 mL

BROMETO DE ROCURÔNIO

USO INTRAVENOSO

Cada cartucho contém 10 frascos contendo 5 mL de solução injetável cada.

SOLUÇÃO INJETÁVEL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Composição - cada mL contém:

brometo de rocurônio.....10 mg

água para injetáveis q.s.p.....1 mL

Excipientes: acetato de sódio, cloreto de sódio, ácido acético e/ou hidróxido de sodio e água para injetáveis.

Informações ao profissional de saúde, indicações, contraindicações e precauções: vide bula.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Fabricado por:

Fresenius Kabi, Lake e Zurich, IL 60047 - Estados Unidos

Importado por:



Fresenius Kabi Brasil Ltda.

Av. Marginal Projetada, 1652 – Barueri – SP

C.N.P.J. 49.324.221/0001-04

Farm. Resp. Cíntia M. P. Garcia - CRF-SP 34871

SAC 0800 7073855

Rotulagem em Inglês:	Tradução para o Português:
 <p>Rocuronium Bromide Injection 50 mg per 5 mL (10 mg per mL)</p>	 <p>ROCURÔNIO Brometo Solução Injetável 50 mg por 5 mL (10mg por mL)</p>
<p>WARNING: Paralyzing Agent For intravenous use. Rx only</p>	<p>AVISO: Agente Paralisante Para uso intravenoso Use apenas sob prescrição médica</p>
<p>5 mL Multiple Dose Vial</p>	<p>5 mL Frasco de dose múltipla</p>
<p>Sterile, nonpyrogenic. WARNING: Paralyzing Agent. Causes Respiratory Arrest. Facilities must be immediately available for artificial respiration.</p>	<p>Estéril, não pirogênico. AVISO: Agente paralisante. Causa parada respiratória. Deve ser administrado em local onde tenha imediatamente disponíveis a respiração artificial.</p>

Each mL contains: 10 mg rocuronium bromide, 2 mg sodium acetate. Adjusted to isotonicity with NaCl and to a pH of 4 with acetic acid and/or NaOH.

STORE AT: 2° to 8°C (36° to 46°F). Do not freeze. Upon removal from refrigeration to room temperature 25°C (77°F), use within 60 days. Use opened vials within 30 days.

Cada mL contém: 10 mg de brometo de rocurônio, 2 mg de acetato de sódio.

Isotonicidade ajustada com cloreto de sódio (NaCl) e o pH = 4 com ácido acético ou hidróxido de sódio (NaOH).

Armazenado em: temperatura de 2°C – 8°C. Não congelar. Após remoção do refrigerador para temperatura de até 25°C, usar dentro de 60 dias. Usar frasco aberto dentro de 30 dias.