

Product Name: SMOFKabiven Inj.	Territory: KR	Colour: <ul style="list-style-type: none"> BLACK DIE CUT 	1. Draft 09.04. 2019 09.20 Uhr	Operator: Christian Nagy +43(0) 34 52 72266-22
Type of Packaging: PIL	Dosage: 493 mL		1. Correction 15.04. 2019 12.00 Uhr	
Material number: MOB0364/00 KR	Z-D-Matrix Code X			
Pharma-Code (Laetus) 2456	EAN Code:			
Dimension: 630 x 210 mm	Font: Smallest Size:			

1

FRESENIUS KABI caring for life	전문약품 분류번호：325
--	-------------------------

스모프카비벤 주

SmofKabiven® Inj. 493 mL

【제품명】 스모프카비벤® 주
493 mL
A액(아미노벤 10%주+전해질) 250 mL, B액(포도당 42%액) 149 mL,
C액(스모프프리드 20%주) 94 mL

【원료약품 및 분량】 A액, B액, C액 각 1000ml 중
A액: 아미노벤 10%주+전해질
유효성분:
L-알라닌(EP) 14.0g
L-아르기닌(EP) 12.0g
글리신(EP) 11.0g
L-히스티딘(EP) 3.0g
L-이소류신(EP) 5.0g
L-류신(EP) 7.4g
초산 L-리신(EP) 9.3g
(L-리신으로서 6.6g)
L-메티오닌(EP) 4.3g
L-페닐알라닌(EP) 5.1g
L-프롤린(EP) 11.2g
L-세린(EP) 6.5g
타우린(USP) 1.0g
L-트레오닌(EP) 4.4g
L-트립토판(EP) 2g
L-티로신(EP) 0.4g
L-발린(EP) 6.2g
염화칼슘이수화물(EP) 0.74g
(염화칼슘으로서 0.56g)
글리세오안산나트륨(무수물)(EP) 4.18g
황산아세트살수화물(EP) 2.47g
(황산마그네슘으로서 1.2g)
염화칼륨(EP) 4.48g
아세트산나트륨삼수화물(EP) 5.62g
(아세트산나트륨으로서 3.4g)
황산아연결수화물(EP) -0.023g
(아연으로서 0.005g)
첨가제: 벙초산, 주사용수

B액: 포도당 42%액
유효성분:
포도당일수화물(EP) 462g
(포도당으로서 420g)
첨가제: 염산 1N, 주사용수

C액: 스모프프리드 20%주
유효성분:
정제대두유(EP) 60g
중쇄트립슬리세라이드(EP) 60g

정제올리브유(EP) 50g
정제어유(고단위 오메가-3 지방산 함유) (EP) 30g
첨가제: 글리세롤, 수산화나트륨, 올레인산나트륨, 정제난인지질, 주사용수, DL-α-토코페롤

【성상】

이 약은 3개의 소실로 나누어진 수액용 플라스틱제정의 내부 백과 외부 포장으로 구성되어 있으며 그 사이에 산소 흡수제가 들어있다. 각각의 내부 백 소실에는 아미노산 및 전해질 용액, 포도당 용액, 그리고 지방 유제가 들어있다. 아미노산 전해질 용액과 포도당 용액은 투명하며, 무색 내지 미황색이고 지방유제는 백색의 균질한 유탁액이다.

【효능·효과】

경구 또는 위장관 영양공급이 불가능, 불충분하거나 제한되어 경정액 영양공급을 실시해야 하는 2세 이상의 소아 및 성인에게 알레르, 아미노산, 필수지방산 및 오메가-3 지방산의 보급

【용법·용량】

환자의 지방 체지방 능력, 질소 및 당 대사 능력, 영양 요구상태에 따라 용량과 주입 속도를 결정한다. 용량은 환자의 상태, 체중, 영양 및 에너지 요구량, 추가적인 경우/경장 부어양을 고려하여 개별화되어야한다. 환자의 상태에 따라 마량원소, 비타민, 전해질 등이 첨가될 수 있다.

체단백량의 유지를 위한 질소의 요구량은 환자의 상태에 근거한다. (예: 영양상태 및 이화작용 스트레스 또는 동화작용)

12세 이상 소아 및 성인

• 정상 영양상태 또는 경증의 대사적 스트레스 상태의 환자：1일 아미노산으로서 0.6–0.9 g/kg(질소로서 0.10–0.15 g/kg)

• 영양 불균형에 관계없이 중등도내지 고도의 대사적 스트레스를 받는 환자：1일 아미노산으로서 0.9–1.6 g/kg(질소로서 0.15–0.25 g/kg)

• 매우 특별한 경우 (예, 화상 혹은 두드러진 동화 상태) 질소량은 더 높을 수 있다.

• 용량：이 약 1일 13–31 mL/kg은 아미노산 0.6–1.6 g/kg (질소로서 0.10–0.25 g/kg)과 총 열량 14–35 kcal/kg (비-단백 열량 12–27 kcal/kg)에 해당한다. 이것은 대부분 환자의 요구량을 만족시킨다. 비만환자의 경우 용량은 예측 정상 몸무게에 근거하여야 한다.

• 투여속도：투여 속도는 시간당 2.0 mL/kg(아미노산 0.10 g/kg, 포도당 0.25 g/kg, 지방 0.08 g/kg에 해당)을 초과해서는 안 된다. 권장 투여 기간은 14–24시간에 걸쳐서 투여하는 것이 바람직하다.

• 1일 최대 용량：1일 최대 용량은 환자의 임상적 상태에 따라 달라지며 날마다 바뀔 수 도 있다. 권장 1일 최대 용량은 35mL/kg이다.
• 권장 1일 최대 용량 35 mL/kg은 아미노산 1.8 g/kg(질소로서 0.28 g/kg), 포도당 4.5 g/kg, 지방 1.33 g/kg, 총 열량 39 kcal/kg (비-단백열량으로서 31 kcal/kg에 해당)을 제공한다.

2-11세 소아

• 용량：소아환자는 성인환자보다 가변성이 크므로, 필요량에 따라 이 약 1일 35 mL/kg까지의 용량을 정기적으로 조정하여 투여한다.
• 투여속도：투여 속도는 시간당 2.4 mL/kg (아미노산 0.12 g/kg, 포도당 0.30 g/kg, 지방 0.09 g/kg)에 해당)을 초과해서는 안 된다. 특수한 상황을 제외하고, 권장 최대 투여 속도에 따라 투여하는 경우 주의깊게 모니터링해야 하며, 투여기간은 14시간 30분 을 넘지 않는다. 권장 투여 기간은 12–24시간이다.

• 1일 최대 용량：1일 최대 용량은 환자의 임상적 상태에 따라 달라지며 날마다 바뀔 수 도 있다. 권장 1일 최대 용량은 35mL/kg이다.
• 권장 1일 최대 용량 35 mL/kg은 아미노산 1.8 g/kg(질소로서 0.28 g/kg), 포도당 4.5 g/kg, 지방 1.33 g/kg, 총 열량 39 kcal/kg (비-단백열량으로서 31 kcal/kg에 해당)을 제공한다.

용법：중심정맥으로 정맥내 점적주입한다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

1) 반드시 의사의 지시에 의하여 사용할 것.
2) 아나필락시스 반응의 징후나 증상 (열, 오한, 발진 혹은 호흡곤란)이 나타나면 투여를 즉각 중단할 것
3) 경맥 칼슘 함유 제제와 세프트리악손을 혼합하여 사용할 때, 세프트리악손-칼슘 혼합물을 일으킬 수 있다. 따라서, 세프트리악손과 이 약을 포함한 정맥 칼슘 함유 제제

를 동일한 주입용 기구를 사용하여 동시에 투여해서는 안된다. 연속주입을 위해 동일한 주입선을 사용해야하는 경우, 주입선을 주입 전/후 적절한 용액으로 철저히 씻어낸다.

4) 미숙아 및 저체중 영아는 정맥 내 지질 제거율이 낮아 지질역 주사 시 혈장 중 유리 지방산 수치가 증가할 수 있다는 보고가 있다. 정제대두유 단일주사제를 심각한 호흡기질환을 가진 미숙아에게 정맥 투여한 후 사망한 사례가 문헌으로 보고되어 있고, 부검결과 폐혈관 내 지방축적이 확인되었다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

1) 어류, 계란, 콩 또는 땅콩 단백질 또는 이 약의 구성분 또는 다른 성분에 과민반응이 있는 환자
2) 중증 고지혈증 환자
3) 중증 간기능 부전 환자
4) 중증 혈액 응집 장애 환자
5) 아미노산 대사의 선천적 이상 환자
6) 혈액 여과나 투석을 실시하지 않는 중증의 신부전 환자
7) 급성 쇼크 환자
8) 조정되지 않은 고혈당증 환자
9) 이 약에 함유된 전해질의 혈청학적 수치가 병적으로 높은 경우
10) 수액 요법의 일반적 급기：급성 폐부종, 수분 과다 증급, 대상부전성 심부전
11) 혈구포식세포 중추근 환자
12) 불안정한 상태, 심한 외상후 상태, 대상부전성 당뇨, 급성 심근 경색증, 뇌졸중, 색전증, 대사성 산증, 중증의 패혈증, 저장성 탈수, 고당성 혼수 등
13) 심근경색 및 그 병력이 있는 환자
14) 2세 미만의 소아

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

1) 신부전, 당뇨병, 췌장염, 간기능 장애, 감삼신기능부전, 패혈증으로 인한 지방대사 이상
2) 젓산 산증, 세로 산소 공급 부족, 혈청 삼투압 증가, 체액소생(fluid resuscitation)의 필요가 있는 환자
3) 전해질 저류 경향이 있는 환자

4. 이상반응

1) 다음의 이상 반응이 나타나거나 투여 기간 중 4 mmol/L 이상의 트립슬리세라이드 레벨 증가가 있을 경우, 이 약의 투여를 중단하거나 감량하여 투여를 지속한다.

	혼하게 ≥1/100 이고, <1/10	혼하지 않게 ≥1/1,000 이고, <1/100	드물게 ≥1/10,000 이고, <1/1,000
심혈관계이상			빈맥
호흡기, 흉부, 종격 이상		식욕부전, 구역,	호흡곤란

위장관계이상	구토	
대사영양이상	혈장 간효소 수치가 증가	
혈관이상	혈청성 전해질	저혈압, 고혈압

일반적 이상 투여부위 이상	체온의 경미한 상승	오한, 두통, 어지러움	과민성반응(아나필락시스성 또는 아나필락시스 반응, 피부 발진, 두드러기, 홍조, 두통), 열감 혹은 냉감, 청색증, 창백증, 통증(목, 등, 뼈, 흉부, 허리)
----------------	------------	--------------	---

2) 지방과다중후군：과다투여로 야기되는 트립슬리세라이드 배설능 손상은 “지방과다중후군”을 초래할 수 있다. 대사적 과다의 증상이 관찰되어야 한다. 원인은 유전적(개인별로 서로 다른 대사)일 수 있거나, 지방 대사는 현재 진행 중이거나 이전의 권중에 의해 영향 받을 수 있다. 이 중후군은 중증 고트립슬리세라이드 혈중에서는 권장 투여 속도보다 나타날 수 있으며, 신기능 장애 혹은 감염과 같은 환자의 임상적 상태의 급격한 변화와 관련하여 나타날 수 있다. 지방과다중후군은 고지혈증, 발열,

지방 침윤, 황달이 수반되거나 그렇지 않은 간비대중, 비장비대중, 빈혈, 백혈구 감소증, 혈소판 감소증, 혈액응고장애, 용혈 및 망상적혈구증가증, 비정상적 간기능 검사 수치, 혼수 등의 특징이 있다. 증상은 일반적으로 지방유체의 주입을 중단하면 회복된다. 지방과다중후군의 증상이 나타나면 이 약의 주입을 중단한다.

3) 아미노산 주입 과다：타 아미노산 제제와 마찬가지로 이 약의 아미노산 함량은 권장 투여 속도를 초과하였을 때 부작용을 일으킬 수 있다; 구역, 구토, 오한, 발한, 아미노산 주입은 또한 체온 상승을 일으킬 수도 있다. 신기능 장애가 있는 경우 대사체 (예, 크레아티닌, 요소)를 포함한 질소 레벨 증가가 나타날 수 있다.

4) 포도당 주입 과다：환자의 포도당 제거능력을 초과한 경우, 고혈당증이 발생할 수 있다.

5) 이 약은 드물게 알레르기 반응을 일으키는 대두유, 어유 및 난황인지를 포함하고 있으며, 대두와 견과류간에 교차 알레르기 반응이 보고되었다.

6) 국내 시판 후 조사결과

(1) 국내에서 재심사를 위하여 6년 동안 1,261명을 대상으로 실시한 시판 후 조사 결과, 유행사태의 발현율은 인과관계와 상관없이 14.99%(189/1,261명, 총 360건)로 보고되었다. 중대한 유행사태는 보고되지 않았다. 예상하지 못한 유행사태의 발현율은 인과관계와 상관없이 10.55%(133/1,261명, 총 1건)로, 변비 2.3%(29/1,261명, 총 29건), 설사 1.35%(17/1,261명, 총 19건), 메렘 0.95%(12/1,261명, 총 12건), 구내염 0.56%(7/1,261명, 총 8건), 설압 0.56%(7/1,261명, 총 7건), 소화불량, 복통 각 0.48%(6/1,261명, 총 6건), 저알부민혈증, 발면증, 발열성호중구감소증 각 0.40%(5/1,261명, 총 5건), 전신쇠약, 부종, 배뇨장애 각 0.32%(4/1,261명, 총 4건), 혈노, 제갈증, 저혈당증, 저칼슘혈증, 가슴쓰림 각 0.24%(3/1,261명, 총 3건), 용인성메렘, 토혈, 콧물, 주입부위 혈관막 유출, 창백함, 시술부위반응, 배뇨곤란, 기침, 갈증 각 0.16%(2/1,261명, 총 2건), 혈청트랜즈암, 혈변, 혈관염, 피부감염, 폐부종, 패혈증, 클로스트리듬감염, 칸디다증, 자이질증, 췌장염, 췌장중과, 췌액양과, 허수양발, 절충혈, 조티나수분비부, 제1차원주, 장폐쇄, 저중구부양, 잇몸출혈, 잇몸지혈, 우울증, 육장, 요실금, 요로감염, 영양실조, 열상, 악무성당뇨, 아스페르길루스증, 아구창, 신경병증중증, 신경병증, 식도염, 수포, 상처감염, 상부부통, 빈뇨, 발한, 복수, 복부팽만감, 무거움, 말초신경염, 말초근, 대장염, 다리부종 뇌허혈, 급성신부전, 근육통, 과민성, 고혈압안과, 잠막출혈, 객혈, 가래진환 각 0.08%(1/1,261명, 총 1건)으로 조사되었다. 이 중 이 약과 인과관계를 배제할 수 없는 예상하지 못한 악물이상반응 발현율은 0.87%(11/1,261명, 총 11건)로 변비, 설사 각 0.16%(2/1,261명, 총 2건), 소화불량, 부종, 전신쇠약, 저혈당증, 빈뇨, 창백함, 주입부위 혈관막 유출 각 0.08%(1/1,261명, 총 1건)이 보고되었다.

(2) 국내 재심사 유행사태 및 자발적 부작용 보고자료를 국내 시판 허가된 모든 의약품에 대상으로 보고된 유행사태 보고자료와 재심사 종료시점에서 통합평가한 결과, 다른 모든 의약품에서 보고된 유행사태에 비해 이 약에서 통계적으로 유의하게 많이 보고된 유행사태 중 새로 확인된 것들은 다음과 같다. 다만, 이 결과가 해당성분과 동일한 유행사태간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

(중심정맥용 주사)

• 위장관계 장애：복통, 설사

• 비뇨기계 질환：배뇨질환

5. 일반적 주의

1) 정맥 투어의 초기에는 세심한 임상적 관찰이 요구된다. 환자에게 조금이라도 비정상적인 징후가 나타나면 투여를 즉시 중단한다.

2) 투여 개시 이전에 전해질 및 체액 불균형 상태(예를 들면, 혈중 전해질 농도가 병상적으로 높거나 낮은 경우)가 개선되어야 한다.

3) 중심 정맥으로 투여를 할 경우 감염 위험도가 높아지므로 카테터를 삽입하고 처치하는 과정에서 오염을 방지하기 위해 엄격한 무균적 작업이 행해지도록 주의하여야 한다.

4) 이 약 투여 기간 중 혈청 중의 트립슬리세라이드 양을 측정하여 지방 제거 능력을 모니터링하여야 한다. 투여 기간 중 트립슬리세라이드의 혈청 중 농도는 4 mmol/L 이하여야 한다. 과량투여는 지방과다중후군을 유발할 수 있다.

5) 아미노산의 정맥 투여는 구내, 아인대 같은 미량 원소들의 노 배설 증가를 수반하므로 장기적 정맥 영양 투여를 할 경우에는 이를 고려하여 미량 원소들의 투여량을 결정하여야 한다.

6) 가운질 반응을 나타낼 위험이 있으므로, 동일한 주입 세트로 이 약과 혈액을 동시에 주입해서는 안 된다.

7) 이 약 투여 기간 중에 혈중 포도당, 전해질, 삼투압, 체액 균형, 산-염기 상태, 간 효소 시험치(ALP, ALT, AST)를 관찰하여야 한다.

8) 이 약을 장기간 투여할 경우에는 혈구수와 응집 반응을 관찰하여야 한다.

9) 신부전 환자들에게 이 약을 투여할 경우, 고인산혈증과 고칼륨혈증을 예방하기 위

해 인산과 칼륨의 섭취를 신중히 조정하여야 한다.

10) 환자의 상태 및 혈중 전해질 농도의 잦은 모니터링을 통하여 추가로 투여할 전해질의 양을 결정한다.

11) 영양 상태가 나쁜 환자에게 비경구 영양 방법은 체액 이동을 촉진시켜, 폐부종 및 용혈성 심부전증 뿐 아니라 칼륨, 인, 마그네슘, 수용성 비타민의 혈청 농도 저하를 초래할 수 있다. 이러한 변화는 24-48시간 이내에 나타나므로, 이러한 환자에서는 비경구 영양 요법을 가시할 경우에는 세심한 관찰과 함께 체액, 전해질, 미네랄 및 비타민을 적절히 조정하면서, 신중하고 완만하게 개시하여야 한다.

12) 고혈당증 환자에서는 외인성 인슐린의 투여가 필요할 수 있다.

13) 이 약에는 아미노산염이 포함되어 있으므로, 2세 미만의 소아에게 투여하지 않는다.

6. 상호작용

1) 인슐린과 같은 약물은 체내 지방 분해 체계를 간섭할 수도 있으나 임상적으로 유의하지 않았다.

2) 임상에서 병용되는 해파린은 지단백 분해 효소가 일시적으로 순환제로 유리되도록 한다. 이것은 투여 초기에 혈장 지방 분해를 증가시켜 트립슬리세라이드 제거율의 일시적 감소를 초래할 수 있다.

3) 대두유는 비타민 K를 포함하고 있지만 이 약에 함유된 양은 극히 적으므로, 쿠마린 유도제를 투여 받는 환자들에게 유효효과기전에 유의한 영향을 줄 것으로 기대되지 않는다.

4) 신생아(≤28일)에서는 다른 칼슘 함유 제제과 마찬가지로 별도의 주입선을 사용하는 경우라도, 세프트리악손과 이 약을 병용하여 사용하지 말 것 (신생아의 혈액에 치명적인 세프트리악손 칼슘 염의 침전 위험)

7. 임부 및 수유부에 대한 투여
임부 및 수유부에서의 이 약 사용에 대한 데이터는 없다. 동물의 생식독성 시험은 이루어지지 않았다. 임신 중과 수유 중의 투여는 안전성이 확립되어 있지 않으므로 이 약의 투여는 치료 상의 유의성이 위험성을 상회하는 경우에만 투여한다.

8. 임상 검사치에의 영향

지방이 혈류로부터 완전히 소실되기 전에 채혈을 하는 경우 이 약의 지방 성분이 몇몇 검사치를 (빌리루빈, 젓산탈수소효소, 산소 포화, 헤모글로빈 등)의 결과를 간섭할 수 있으므로 투여 후 5-6시간이 경과하고 나서 채혈을 하는 것이 바람직하다.


9. 과량 투여시의 처치

1) 지방 또는 아미노산 과량 투여로 인한 증상이 나타나다면, 주입 속도를 늦추거나 주입을 중단하여야 한다. 과량 투여시 특별한 해독제는 없다. 응급 처치는 일반적인 지지요법을 따르되 호흡기계와 심혈관계에 특별한 주의를 기울여야 한다. 세심한 생화학적 모니터링이 필수적이며 특별한 이상은 적절히 처치한다.
2) 과혈당증이 나타나면, 임상적 상태에 따라 적절한 인슐린 투여 및/또는 주입 속도 조절을 통하여 처치한다.
3) 또한, 과량투여는 체액 과부하, 전해질 불균형 및 고삼투압증을 일으킬 수 있다. 몇몇 드물게 심각한 경우에는, 혈액투석, 혈액여과 또는 혈액-투석여과가 고려될 수 있다.

10. 적응상의 주의

1) 포장에 손상된 경우 사용하지 않는다.
2) 소실 (chamber) 사이의 봉합이 파손된 경우 사용하지 않는다.
3) 포도당 용액과 아미노산 전해질 용액이 투명하고, 지방 유제가 균질할 때에만 사용한다.
4) 분더넬 각 소실(chamber)에 있는 용액은 사용 직전에 혼합되어야 한다.
5) 첨가제는 이 약 혼합 후 첨가제 포트를 통해 첨가한다. 첨가는 무균적으로 이루어져야 한다.
6) 봉합이 열린 후 백을 여러 번 상하로 움직여 혼분리를 보이지 않도록 균질하게 혼합한다.
7) 이 약과 배합적합성이 확인된 의약품만을 첨가한다.
8) 과도한 빠른 속도로 주입될 때 야기되는 위험을 피하기 위하여 지속적이며 잘 제어되는 주입을 권장하며, 가능하다면 주입 펌프의 이용이 권장된다.
9) 투여 후 남은 혼합액은 버린다.
10) 용기에 있는 공기로 인한 공기거품전증의 가능성을 피하기 위하여 연속하여 연결해서는 안 된다.

6



11. 보관 및 취급상의 주의사항

1) 25℃ 이하에서 보관한다.
2) 이 약의 내용물이 혼합된 경우 및 첨가제와 함께 이 약의 내용이 혼합된 경우 그 혼합액은 즉시 사용한다. 만약 즉시 사용하지 않았다면 사용할 수 있는 보관 조건 및 기간은 통상적으로 2-8℃에서 24시간 이하이다.

【저장방법】

밀봉용기, 25℃이하에서 열리지 않고 보관.

【포장단위】

- 493ml/백(A액 250ml, B액 149ml, C액 94ml) X 6

※ 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 제품은 병·의원, 도매상에 한하여 교환하여 드립니다.


※ 이 첨부문서 개정일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.fresenius-kabi.co.kr) 제품정보란에서 확인할 수 있습니다.

※ 부작용 피하구제 신청：한국의약품안전관리원(1644-6223)

제 조 자：Fresenius Kabi Austria GmbH Hainterstrasse 36, AT-8055 Graz, Austria Fresenius Kabi Austria GmbH Estermannstraße 17 4020 Linz, Austria (2차포장) Fresenius Kabi Austria GmbH Am Gewerbepark 6 8402 Werdnorf, Austria (2차포장)


수 입 자：프레지니우스 카비 코리아(주) 서울특별시 송파구 백제고분로 69, 8층, 9층 (잠실동) Tel：02)3484-0900(대)

첨부문서 최종 개정 연월일：2019. 02. 28




Instructions for use

백






- ① 겹포장제 절취부
- ② 손잡이
- ③ 제품 길이용 구멍
- ④ 개봉 가능한 접합부
- ⑤ Blind port
- ⑥ Additive port (첨가제 주입 포트)
- ⑦ Infusion port (수액세트 주입 포트)
- ⑧ 산소흡수제

1. 겹포장제의 제거




• 백을 수평으로 잡고 포트 가까이 있는 절취부(A)를 찢어 겹포장을 벗기고 백을 꺼냅니다(B). 산소흡수제는 버려도 좋습니다.

2. 혼합




• 백을 평평한 곳에 위치한 후, 손잡이 부분에서부터 접합부분이 개봉될 때까지 백을 말아 올리면서 힘주어 눌러줍니다. 이때, A액과 B액을 먼저 혼합한 후, C액을 가장 나중에 혼합하는것을 권장합니다. (겹포장제를 제거하지 않은 상태에서도 백 내용물의 혼합이 가능합니다.)



• 두 개의 접합부위가 열린 후, 백을 여러 번 상하로 움직이면 완전히 섞여 흰색 유탁액의 성상을 확인합니다. 가로 접합부는 개봉되지 않습니다.



3. 투여준비



• 백을 평평한 곳에 놓습니다. 첨가제를 주입하기 직전 흰색 화살표 탭을 제거합니다. (A) (Additive port의 막은 열려 되어 있어 처음 사용시 소독 과정이 필요없습니다.)

• Additive port (첨가제 포트)의 아래부분을 잡고 주입부의 중앙에 바늘을 삽입하여 첨가제를 주입합니다. (B)

• 여러 종류의 첨가제를 삽입할 경우, 매회 주입이 끝날 때마다 백을 최소 3회 이상 위아래로 섞어줍니다. 20-23 gauge의 syringe를 사용하며, 최장 길이는 40mm의 사용을 권장합니다.




• infusion set (수액세트)를 주입하기 직전, Infusion port의 파란색 화살표탭을 제거합니다. (A) (Infusion port의 막은 열려 되어 있어 처음 사용시 소독 과정이 필요없습니다.)

• 공기구멍이 없는 Infusion set 혹은 공기구멍이 닫힌 set를 사용합니다.

• Infusion set의 아래부분을 잡고 Infusion set를 깊숙이 삽입합니다.

4. 백의 고정



• 손잡이 하단에 위치한 구멍을 이용하여 백을 행거에 매듭니다.

