

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

**СМОФКабивен® периферический**

наименование лекарственного препарата

**Эмульсия для инфузий**

лекарственная форма, дозировка

**Фрезениус Каби Дойчланд ГмбХ, Германия**

наименование юридического лица на имя, которого выдано регистрационное удостоверение, адрес

**Фрезениус Каби АБ, Швеция**

наименование производителя, страна

Изменение № 1 к Инструкции ЛП-000627-040423

Дата внесения Изменения «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Старая редакция	Новая редакция
<p><b>Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами</b></p> <p>Не применимо. Препарат применяется для лечения пациентов, находящихся в отделениях реанимации и интенсивной терапии.</p>	<p><b>Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами</b></p> <p>Не применимо.</p>
<p><b>Форма выпуска</b></p> <p>Эмульсия для инфузий</p> <p>По 1206 мл, 1448 мл или 1904 мл смеси в трёхкамерном пластиковом контейнере «Биофин», каждая камера которого</p>	<p><b>Форма выпуска</b></p> <p>Эмульсия для инфузий</p> <p>По 1206 мл, 1448 мл или 1904 мл смеси в трёхкамерном пластиковом контейнере «Биофин», каждая камера которого</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>содержит один из растворов: камера, содержащая 10% раствор аминокислот с электролитами (380 мл, 456 мл или 600 мл соответственно); камера, содержащая 13 % раствор декстрозы (656 мл, 788 мл или 1036 мл соответственно); камера, содержащая 20% жировую эмульсию (170 мл, 204 мл или 268 мл соответственно). Каждый контейнер (из полипропилена) вместе с антиокислителем помещают в наружный пластиковый мешок (из полиэтилена).</p> <p>По 4 мешка (контейнера) вместе с инструкцией по применению помещают в картонную коробку (для стационаров).</p>	<p>содержит один из растворов: камера, содержащая 10% раствор аминокислот с электролитами (380 мл, 456 мл или 600 мл соответственно); камера, содержащая 13 % раствор декстрозы (656 мл, 788 мл или 1036 мл соответственно); камера, содержащая 20% жировую эмульсию (170 мл, 204 мл или 268 мл соответственно). Каждый контейнер (из полипропилена) вместе с антиокислителем помещают в наружный пластиковый мешок (из полиэтилена).</p> <p>По 4 мешка (контейнера) вместе с инструкцией по применению помещают в картонную коробку.</p>
<p><b>Условия отпуска</b> Для стационаров.</p>	<p><b>Условия отпуска</b> Отпускают по рецепту.</p>

Менеджер по регистрации  
 ООО «Фрезениус Каби»



Т.А.Таланова