FACHKURZINFORMATION

Laxogol Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen

Qualitative und quantitative Zusammensetzung:

Jeder Beutel enthält die folgenden arzneilich wirksamen Bestandteile: Macrogol 3350 (Polyethylenglykol 3350) 13,125 g, Natriumchlorid 0,3507 g, Natriumhydrogencarbonat 0,1785 g, Kaliumchlorid 0,0466 g. Der Inhalt eines Beutels (13,8 g Pulver) wird in 125 ml Wasser gelöst. Die fertige Trinklösung enthält: Natrium 65 mmol/l, Chlorid 53 mmol/l, Hydrogencarbonat 17 mmol/l, Kalium 5 mmol/l. Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wirkung: Enthält 0,76 mg Sorbitol (E420) pro Beutel. Vollständige Auflistung der sonstigen Bestandteile siehe Abschnitt 6.1.

Anwendungsgebiete:

Zur Anwendung bei chronischer Obstipation. Laxogol ist auch wirksam bei Koprostase, einer hartnäckigen Obstipation mit Kotstau im Rektum und/oder Kolon.

Gegenanzeigen:

Intestinale Perforation oder Obstruktion aufgrund von strukturellen oder funktionellen Störungen der Darmwand, Ileus, schwere entzündliche Darmerkrankungen wie Colitis ulcerosa und Morbus Crohn sowie toxisches Megakolon. Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Bestandteile.

Pharmakotherapeutische Gruppe:

Osmotisch wirksame Laxantien.

ATC-Code:

A06AD65.

Liste der sonstigen Bestandteile:

Hochdisperses Siliciumdioxid, Saccharin-Natrium, Orangen-Aroma (Orangen-Aroma enthält: Aromastoffe und Aromaextrakte, Maltodextrin, Gummi arabicum, alpha-Tocopherol), Zitronen-Limetten-Aroma (Zitronen-Limetten-Aroma enthält: Aromaextrakte, Maltodextrin, Mannitol (E421), D-Glucono-1,5-lacton, Sorbitol (E420), Gummi arabicum, hochdisperses Siliciumdioxid).

Inhaber der Zulassung:

Fresenius Kabi Austria GmbH, 8055 Graz, Österreich.

Rezeptpflicht/Apothekenpflicht:

Rezeptfrei, apothekenpflichtig.

Stand der Information:

November 2024.

Weitere Angaben zu besonderen Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln oder sonstigen Wechselwirkungen, Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen sowie Gewöhnungseffekten entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation.