

FACHKURZINFORMATION

Trimix perikal Emulsion zur Infusion

Qualitative und quantitative Zusammensetzung:

600 ml enthalten: 250 ml . Aminoven 10 %, 100 ml Glucose 30 %, 250 ml SMOFlipid 200 mg/ml. 600 ml gebrauchsfertige Lösung enthalten: L-Isoleucin 1,250 g, L-Leucin 1,850 g, L-Lysinacetat 2,325 g entspr. L-Lysin 1,650 g, L-Methionin 1,075 g, L-Phenylalanin 1,275 g, L-Threonin 1,100 g, L-Tryptophan 0,500 g, L-Valin 1,550 g, L-Arginin 3,000 g, L-Histidin 0,750 g, L-Alanin 3,500 g, Glycin 2,750 g, L-Prolin 2,800 g, L-Serin 1,625 g, L-Tyrosin 0,100 g, Taurin 0,250 g, Glucose-Monohydrat 33 g entspr. Glucose 30 g, raffiniertes Sojaöl (Ph.Eur.) 15 g, mittelkettige Triglyceride 15 g, raffiniertes Olivenöl 12,5 g, Omega-3-Säuren reiches Fischöl 7,5 g. Gesamtenergiegehalt: ca. 3024 kJ (= ca. 720 kcal). Non-Protein- Energiegehalt: ca. 2604 kJ (= ca. 620 kcal). Aminosäuregehalt: ca. 25 g. Stickstoffgehalt: ca. 4,05 g. Sonstige Bestandteile mit bekannter Wirkung: Ein Beutel (600 ml Trimix perikal) enthält 8,54 mg Natrium. Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol Natrium (23 mg) pro Beutel. Vollständige Auflistung der sonstigen Bestandteile, siehe Abschnitt 6.1.

Anwendungsgebiete:

Parenterale Ernährung für Erwachsene, Kinder und Jugendliche ab zwei Jahren mit Malnutrition bei gleichzeitiger Volumenrestriktion, wenn eine orale oder enterale Ernährung unmöglich, unzureichend oder kontraindiziert ist.

Gegenanzeigen:

Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe, gegen Fisch-, Ei-, Soja oder Erdnussprotein oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Bestandteile; Kinder unter 2 Jahren.

Pharmakotherapeutische Gruppe:

Lösungen zur parenteralen Ernährung,

ATC-Code:

B05BA10.

Liste der sonstigen Bestandteile:

Eisessig, Eilecithin, α -Tocopherol, Glycerol, Natriumhydroxid, Natriumoleat, Salzsäure, Wasser für Injektionszwecke.

Rezeptpflicht/Apothekenpflicht:

Rezept- und apothekenpflichtig.

Inhaber der Zulassung:

Fresenius Kabi Austria GmbH, 8055 Graz, Österreich.

Stand der Information:

August 2020.

Weitere Angaben zu besonderen Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln oder sonstigen Wechselwirkungen, Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen sowie Gewöhnungseffekten entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation.