

DIPEPTIVEN® (alanilglutamina). **Indicações:** indicado como parte de um regime de nutrição clínica em pacientes em estado hipercatabólico e/ou hipermetabólico. Deve ser administrado em conjunto com nutrição parenteral ou oral ou uma combinação de ambos. **Contraindicações:** pacientes com insuficiência renal (clearance de creatinina < 25 mL/min), insuficiência hepática severa, choque circulatório, hipóxia, falência múltipla de órgãos, acidose metabólica severa ou hipersensibilidade ao princípio ativo ou aos outros componentes da fórmula, pacientes com uremia ou encefalopatia hepática resultante da insuficiência renal ou hepática. Contraindicado para pacientes pediátricos. **Precauções e advertências:** Para uma administração segura, a dose máxima de Dipeptiven não deve exceder 2,5 ml (correspondendo a 0,5 g de alanilglutamina) por kg de peso corpóreo por dia. Dipeptiven só deve ser utilizado como parte da nutrição clínica e a sua dosagem é limitada pela quantidade de proteínas/aminoácidos fornecidos pela nutrição (ver item 8. POSOLOGIA E MODO DE USAR). Sempre que a condição clínica não permitir a nutrição (por exemplo, choque circulatório, hipóxia, pacientes críticos instáveis, acidose metabólica grave) Dipeptiven não deve ser administrado. A ingestão oral/enteral de fórmulas suplementadas com glutamina em combinação com nutrição parentérica deve ser levada em consideração para o cálculo da dose prescrita de Dipeptiven. Acompanhar regularmente os parâmetros da função hepática em pacientes com insuficiência hepática compensada. Monitorar os níveis plasmáticos de eletrólitos, de osmolaridade, do balanço hídrico, do equilíbrio ácido-básico, clearance de creatinina, ureia, assim como marcadores de lesão hepatocítica (fosfatase alcalina, ALT, AST) e possíveis sintomas de hiperamonemia. Deve-se também monitorar os níveis de bilirrubina. Não há recomendações especiais para idosos, porém o produto deve ser administrado com cautela neste grupo de pacientes. Não foram realizados estudos em animais e nem em mulheres grávidas. Risco de gravidez categoria C: este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista. **Interações medicamentosas:** Não são conhecidas interações medicamentosas até o momento. **Reações adversas:** Se não for utilizado na forma recomendada, reações adversas podem acontecer. Se administrado acima da velocidade de infusão indicada, assim como outras soluções injetáveis, pode causar calafrio, náusea e vômito. Caso ocorra alguma reação adversa descontinue a infusão, avalie o paciente e institua terapia apropriada. **Posologia:** solução concentrada que deve ser diluída antes da administração por veia periférica. A escolha da administração por veia central ou periférica depende da osmolaridade final da mistura. O limite geralmente aceito para administração periférica é de cerca de 800 mOsmol/L, mas pode variar consideravelmente com a idade, condições gerais do paciente e com as características da veia periférica. Soluções de misturas com osmolaridade acima de 800 mOsmol/L devem ser infundidas por via central venosa.

O produto é administrado em paralelo com nutrição parenteral ou oral ou uma combinação de ambos. A dose depende da gravidade do estado catabólico e da necessidade de aminoácidos/proteínas do paciente. Dose diária de 1,5 – 2,5 mL de Dipeptiven® por quilo de peso corpóreo (equivalente a 0,3 - 0,5 g alanilglutamina/kg de peso corpóreo). Pacientes com nutrição parenteral total: A velocidade de infusão depende da solução carreadora e não deve exceder 0,1 g de aminoácidos/kg de peso corpóreo/hora. O produto deve ser misturado previamente à administração com uma solução carreadora de aminoácidos compatível ou com um regime de infusão contendo aminoácidos. Pacientes com nutrição enteral total: O produto é continuamente infundido por 20-24 horas por dia. Para infusão periférica venosa, dilua DIPEPTIVEN (alanilglutamina) a uma osmolaridade ≤ 800 mOsmol/L (p.ex. 100 mL de DIPEPTIVEN + 100 mL de solução salina). Pacientes com nutrição enteral e parenteral combinada: A dose total diária de DIPEPTIVEN (alanilglutamina) deve ser administrada com nutrição parenteral, misturada com uma solução de aminoácidos compatível ou com um regime de infusão contendo aminoácidos previamente à administração. A taxa de infusão depende da solução carreadora e deve ser ajustada de acordo com as proporções das nutrições parenteral e enteral. A duração do tratamento não deve exceder 3 semanas. **MS 1.0041.9926. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. USO RESTRITO A HOSPITAIS.**

Registrado e Importado por:

Fresenius Kabi Brasil Ltda.

Av. Marginal Projetada, 1652 Baureri - SP

CNPJ: 49.324.221/0001-04

0800 707 3855