


IDACIO® Barn Patientkort

Detta kort sammanfattar viktig säkerhetsinformation som du behöver känna till före och under ditt barns behandling med IDACIO®.



- Ha detta kort i närheten när ditt barn behandlas med IDACIO® och de 4 följande månaderna efter ditt barns sista injektion med IDACIO®.
- Visa kortet för all sjukvårdspersonal som ditt barn har kontakt med.
- Alla möjliga biverkningar är inte listade på kortet. För att se hela listan behöver du läsa IDACIOS bipacksedel, eller be ditt barns läkare om mer information om biverkningar.
- Var god gör en notering på insidan av kortet om alla tuberkulostest eller behandlingar som ditt barn fått.
- Tala med ditt barns läkare eller sjuksköterska om du har frågor om fördelar och biverkningar med behandlingen, eller om du har andra frågor om IDACIO®.

Introduktion

IDACIO® är ett läkemedel som är avsett för behandling av vissa sjukdomar som har med en del av immunförsvaret att göra. Eftersom IDACIO® angiper de delar av immunförsvaret som orsakar dessa sjukdomar kan vissa patienter få en eller flera biverkningar.

Detta kort beskriver vissa av de biverkningar och symtom som du kan få när du tar IDACIO®. Exempel på allvarliga biverkningar är infektioner, cancer och problem med nervsystemet.

Dessa nämnda täcker inte alla möjliga biverkningar med IDACIO®.

Före behandling med IDACIO®

Tala om för ditt barns läkare om hen har några hälsoproblem eller om barnet tar några läkemedel. Det hjälper dig och ditt barns läkare besluta om IDACIO® är rätt för ditt barn.

Berätta för din läkare om ditt barn:

- Har en infektion eller infektionssymtom, såsom feber, sår, utmattning eller tandproblem.
- Har tuberkulos eller om han eller hon har varit i kontakt med någon som har tuberkulos.
- Har eller har haft cancer.
- Har domningar, stickningar eller problem med nervsystemet, såsom multipel skleros.

Din barns läkare bör försäkra sig om att barnet inte har tuberkulos när IDACIO-behandlingen påbörjas. Om barnet har tuberkulos behöver sjukdomen behandlas innan IDACIO®-behandlingen kan påbörjas.

Vaccinationer

- Ditt barns läkare kan föreslå vissa vaccinationer till ditt barn innan start med IDACIO®. Levande vacciner får inte ges till ditt barn under behandling med IDACIO®. Om du har behandlats med IDACIO® under din graviditet är det viktigt att du informerar ditt barns läkare innan ditt barn får någon vaccination. Barnet bör inte ges "levande vacciner", som BCG (för att behandla tuberkulos) innan 5 månader sedan din sista IDACIO® injektion du fick under din graviditet..

Under behandlingen med IDACIO®

Håll ditt barns läkare informerad om hur IDACIO® fungerar för ditt barn och hur ditt barn mår under behandlingen.

Det är viktigt att du kontaktar ditt barns läkare så snart du upptäcker några ovanliga symptom. Det säkerställer att ditt barn får rätt vård direkt, vilket minskar risken för att biverkningar förvärras. Många biverkningar, inklusive infektioner, kan mildras om du informerar ditt barns läkare så fort du upptäcker dem.

Om läkaren kan bekräfta att ditt barn har en biverkan kommer denne avgöra om barnet ska fortsätta med IDACIO®-behandlingen eller inte. Du ska också rapportera eventuella ovanliga symtom upp till 70 dagar efter ditt barns sista IDACIO-injektion.

Biverkningar ska också rapporteras till Fresenius Kabi via:
pharmacovigilance@fresenius-kabi.com.

Tala om för ditt barns läkare om barnet har någon ny sjukdom eller behandling, eller om barnet har någon operation inplanerad.

Biverkningar

Om ditt barn får några av följande symtom, ring barnets läkare för omedelbar vård eftersom ditt barn kan ha drabbats av en allvarlig biverkan av IDACIO®.

Infektioner

IDACIO® angriper delar av immunförsvaret som tar hand om inflammationer, vilket betyder att ditt barn kan ha ett försvagat immunförsvaret mot vissa infektioner. Det kan göra att ditt barn löper större risk för att utveckla infektioner eller att befintliga infektioner förvärras, såsom förkylningar eller i allvarligare fall tuberkulos.

Kontakta ditt barns läkare så fort du upptäcker följande symtom:

Feber, frossa, ovanlig svettning, allmän sjukdomskänsla, utmattning, illamående eller kräkningar, diarré, magsmärta, aptitlöshet, viktnedgång, hosta eller blodhosta eller slemhosta, andfåddhet, svårigheter att kissa, öm hud, sår, muskelsmärta, tandproblem.

Cancer

IDACIO® kan öka risken för att få vissa typer av cancer.

Relaterade symptom:

Nattliga svettningar, svullna körtlar i halsen, armhålor, ljumskar eller andra områden, vikt-nedgång, nya eller förändrade hudförändringar (t. ex. födelsemärken eller fräknar), onormal svår klåda.

Biverkningar. Fortsättning från andra sidan

Problem med nervsystemet

IDACIO® kan öka risken för ditt barn att utveckla problem med nervsystemet eller att befintliga problem förvärras, t. ex. multipel skleros.

Relaterade symtom:

Domningar eller stickningar, synförändringar, muskelsvaghet, ovanlig yrsel.

För att se hela listan med biverkningar som kan uppstå vid IDACIO®-behandling, se IDACIOs bipacksedel eller be ditt barns läkare om mer information om biverkningar.

Dessutom ska du tala om för läkaren om ditt barn får några andra ovanliga symtom som inte finns med i listan när du tar IDACIO®.

Information till dig och ditt barns sjukvårdspersonal:

Ditt barns namn:

Förskrivande läkares namn:

Telefonnummer:

Indikation:

Datum för den första IDACIO-injektionen:

IDACIO-dosering:

Datum för den sista IDACIO-injektionen:

Tuberkulos (TBC)-tester och behandling

Kryssa i denna ruta om ditt barn någon gång testats för TBC:

JA (Fråga barnets läkare om du är osäker)

Kryssa i denna ruta om ditt barn någon gång testats positivt för TBC:

JA (Fråga barnets läkare om du är osäker)

Kryssa i denna ruta om ditt barn någon gång har fått tabletter för att behandla eller förebygga TBC:

JA (Fråga barnets läkare om du är osäker)

Var god läs IDACIO-bipacksedel för mer information. Tala med ditt barns läkare om du har några frågor.

Fresenius Kabi AB
751 74 Uppsala

För medicinsk information och kontakt:
Tel: 020-116 68 44



FKS BIOSIM 113 10 2019

