


IDACIO® Patientkort

Detta kort sammanfattar viktig säkerhetsinformation som du behöver känna till före och under behandling med IDACIO®.



- Ha detta kort i närheten när du behandlas med IDACIO®, och de följande 70 dagar efter den sista injektionen.
- Visa kortet för all sjukvårdspersonal som du har kontakt med.
- Var god gör en notering på insidan av kortet om alla tuberkulostest eller behandlingar som du fått.

Introduktion

IDACIO® används för behandling av sjukdomar som har med immunförsvaret att göra.

Medan IDACIO® kan vara effektiv i att behandla dessa sjukdomar kan vissa patienter få en eller flera biverkningar. Det är viktigt att prata med din läkare om möjliga fördelar och möjliga biverkningar med IDACIO®. Dessa kan vara olika för varje person.

Detta kort beskriver vissa av de biverkningar som du kan få när du tar IDACIO®. Exempel på allvarliga biverkningar som kan förekomma är infektioner, cancer och problem med nervsystemet. Nämda är inte alla möjliga biverkningar med IDACIO®.

Innan behandling med IDACIO®

Tala om för din läkare om du har några hälsoproblem eller om du tar några läkemedel. Det underlättar för dig och din läkare att ta beslut om IDACIO® är rätt för dig.

Innan behandling med IDACIO®

Tala om för din läkare om du har några hälsoproblem eller om du tar några läkemedel. Det underlättar för dig och din läkare att ta beslut om IDACIO® är rätt för dig.

Berätta för din läkare om du:

- Har en infektion eller infektionssymtom, såsom feber, sår, utmattning eller tandproblem.
- Har tuberkulos, eller om du varit i kontakt med någon som har tuberkulos.
- Har eller har haft cancer.
- Har domningar, stickningar eller problem med nervsystemet, såsom multipel skleros.

Din läkare bör försäkra sig om att du inte har tecken eller symtom på tuberkulos innan du påbörjar IDACIO®-behandlingen. Om du har tuberkulos behöver sjukdomen behandlas innan IDACIO®-behandlingen kan påbörjas.

Vaccinationer

- Du får ta vaccinationer, förutom levande vacciner.
- Om du använde IDACIO® medan du var gravid är det viktigt att du informerar din babys läkare innan din baby får något vaccin. Din baby får inte ges ett levande vaccin, som en BCG-vaccination (som används för att förebygga tuberkulos) inom 5 månader efter din senaste injektion med IDACIO® under din graviditet.

Under behandlingen med IDACIO®

För att säkerställa att IDACIO® fungerar rätt och säkert för dig bör du underrätta din läkare regelbundet för att berätta hur du mår.

Håll din läkare informerad om hur Idacio-behandlingen fungerar för dig

- Det är viktigt att du kontakter din läkare omgående när du upptäcker några ovanliga symtom. Det säkerställer att du får rätt vård, vilket minskar risken att en biverkning förvärras.
- Många biverkningar, inklusive infektioner, kan begränsas om du informerar din läkare omgående.
- Om läkaren kan bekräfta att du har en biverkan kommer denne avgöra om du ska fortsätta med IDACIO®-behandlingen eller inte. Det är viktigt att du pratar med din läkare för att upptäcka vad som passar just dig.
- Eftersom biverkningar kan förekomma efter att du tagit den sista dosen IDACIO®, informera din läkare om eventuella problem du kan få upp till 70 dagar efter din sista injektion med IDACIO®.

Informera din läkare om:

- Varje ändring i din hälsa du upplever.
- Varje nytt läkemedel du tar.
- Om du ska genomgå en operation.

Vissa personer som behandlas med IDACIO® kan få allvarliga biverkningar, som:

Infektioner

IDACIO® angriper delar av immunförsvaret som tar hand om inflammationer, vilket betyder att du kan ha ett försvagat immunförsvaret mot vissa infektioner. Detta kan göra att du löper större risk för att utveckla infektioner eller att befintliga infektioner förvärras, såsom förkylningar eller i allvarligare fall tuberkulos.

Cancer

IDACIO® kan öka risken för att få vissa typer av cancer.

Relaterade symptom:

Nattliga svettningar, svullna körtlar i halsen, armbålor, ljumskar eller andra områden, viktnedgång, nya eller förändrade hudförändringar (t.ex. födelsemärken eller fräcknar), onormal svår klåda.

Biverkningar fortsätter på nästa sida

Biverkningar. Fortsättning från andra sidan

Problem med nervsystemet

IDACIO® kan öka risken för att utveckla problem med nervsystemet eller att befintliga problem förvärras, t. ex. multipel skleros.

Relaterade symptom:

Domningar eller stickningar, synförändringar, muskelsvaghet, ovanlig yrsel.

Se hela listan med biverkningar som kan uppstå vid IDACIO®-behandling i IDACIO®s bipacksedel.

Ta omgående kontakt med din läkare om du får några av dem följande symtom:

- Feber, frossa, ovanliga svettningar, känner dig dålig eller mer trött än normalt, illamående eller kräkningar, diarré, ont i magen, aptitlöshet eller viktförlust, hosta eller upphostningar av blod eller slem, andnöd, problem att urineria, hudsår, sår, muskelkramper eller tandproblem.

Information till dig och vårdpersonalen:

Ditt namn:

Förskrivande läkares namn:

Telefonnummer:

Indikation:

Datum för den första IDACIO-injektionen:

IDACIO-dosering:

Datum för den sista IDACIO-injektionen:

Tuberkulos (TBC)-tester och behandling

Kryssa i denna ruta om du någon gång testats för TBC:

JA (Fråga din läkare om du är osäker)

Kryssa i denna ruta om du någon gång testats positivt för TBC:

JA (Fråga din läkare om du är osäker)

Kryssa i denna ruta om du någon gång har fått tabletter för att behandla eller förebygga TBC:

JA (Fråga din läkare om du är osäker)

Var god läs IDACIO-bipacksedel för mer information. Tala med din läkare om du har några frågor.

Fresenius Kabi AB
751 74 Uppsala

För medicinsk information och kontakt:
Tel: 020-116 68 44



FKS BIOSIM 108 10 2019

