

## FACHKURZINFORMATION

### **Ceftazidim Kabi 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung** **Ceftazidim Kabi 2 g Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung**

#### **Qualitative und quantitative Zusammensetzung:**

1 Durchstechflasche enthält 1 g (2 g) Ceftazidim (als Ceftazidim 5 H<sub>2</sub>O). Sonstiger Bestandteil: Dieses Arzneimittel enthält 2,3 mmol (4,6 mmol) 52 mg (104 mg) Natrium je 1 g (2 g) Ceftazidim. Vollständige Auflistung der sonstigen Bestandteile, siehe Abschnitt 6.1.

#### **Anwendungsgebiete:**

Ceftazidim Kabi wird angewendet bei Erwachsenen und Kindern inklusive Neugeborenen (von Geburt an), bei Infektionen, die untenstehend aufgelistet sind: Nosokomiale Pneumonie; Broncho-pulmonale Infektionen bei zystischer Fibrose; bakterielle Meningitis; chronisch eitrige Otitis media; maligne Otitis externa; komplizierte Harnwegsinfektionen; komplizierte Haut- und Weichteilinfektionen; komplizierte intraabdominale Infektionen; Knochen und Gelenksinfektionen; Peritonitis assoziiert mit Dialyse bei CAPD-Patienten. Behandlung von Patienten mit Bakteriämie im Zusammenhang oder bei vermutetem Zusammenhang mit einer der oben angeführten Infektionen. Ceftazidim kann zur Behandlung von neutropenischen Patienten mit Fieber, aufgrund einer vermuteten bakteriellen Infektion, eingesetzt werden. Ceftazidim kann als peri-operative Prophylaxe für Harnwegsinfekte bei Patienten, die sich einer trans-urethralen Resektion der Prostata (TURP) unterziehen, verwendet werden. Bei der Wahl von Ceftazidim sollte sein antibakterielles Spektrum berücksichtigt werden, welches hauptsächlich auf aerobe Gram-negative Bakterien limitiert ist (siehe Abschnitt 4.4 und 5.1). Ceftazidim sollte gemeinsam mit anderen antibakteriellen Substanzen angewendet werden, wenn die mögliche Bandbreite der verursachenden Bakterien nicht vom Wirkspektrum von Ceftazidim abgedeckt wird. Offizielle Richtlinien zum angemessenen Gebrauch von antibakteriellen Arzneimitteln sollten berücksichtigt werden.

#### **Gegenanzeigen:**

Überempfindlichkeit gegen Ceftazidim, andere Cephalosporine oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Bestandteile. Schwere Überempfindlichkeit (z.B. anaphylaktische Reaktion) gegen andere Beta-Lactam-Antibiotika (Penicilline, Monobactame und Carbapeneme) in der Anamnese.

#### **Pharmakotherapeutische Gruppe:**

Antibiotika zur systemischen Anwendung, Cephalosporine der dritten Generation.

#### **ATC-Code:**

J01DD02.

#### **Liste der sonstigen Bestandteile:**

Natriumcarbonat.

#### **Rezeptpflicht/Apothekenpflicht:**

Rezept- und apothekenpflichtig, wiederholte Abgabe verboten.

#### **Inhaber der Zulassung:**

Fresenius Kabi Austria GmbH, 8055 Graz, Österreich.

#### **Stand der Information:**

Oktober 2020.

Weitere Angaben zu besonderen Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln oder sonstigen Wechselwirkungen, Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen sowie Gewöhnungseffekten entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation.