

## DENOMINATION DU MEDICAMENT

**IRINOTECAN FRESENIUS 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion**

## COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

|  |          |
|--|----------|
| Chlorhydrate d'irinotécan trihydraté ..... | 20,00 mg |
| <i>Sous forme d'irinotécan</i> .....       | 17,33 mg |

Pour 1 ml de solution.

Un flacon de 2 ml contient 40 mg de chlorhydrate d'irinotécan trihydraté (40 mg/2 ml).

Un flacon de 5 ml contient 100 mg de chlorhydrate d'irinotécan trihydraté (100 mg/5 ml).

Un flacon de 15 ml contient 300 mg de chlorhydrate d'irinotécan trihydraté (300 mg/15 ml).

Un flacon de 25 ml contient 500 mg de chlorhydrate d'irinotécan trihydraté (500 mg/25 ml).

Excipient à effet notoire : sorbitol.

Pour la liste complète des excipients, voir rubrique « Liste des excipients ».

## FORME PHARMACEUTIQUE

Solution à diluer pour perfusion.

Solution limpide.

Le pH de la solution à diluer pour perfusion est de 3,0 à 4,0 et l'osmolarité est de 265 à 320 mosmol/l.

## DONNEES CLINIQUES

### Indications thérapeutiques

L'irinotécan est indiqué dans le traitement des patients présentant un cancer colorectal avancé :

- en association avec le 5-fluorouracile et l'acide folinique chez les patients n'ayant pas reçu de chimiothérapie antérieure pour le stade avancé de leur maladie,
- en monothérapie après échec d'un traitement ayant comporté du 5-fluorouracile.

L'irinotécan en association avec le cetuximab est indiqué dans le traitement des patients présentant un cancer colorectal métastatique avec gène KRAS de type sauvage exprimant le récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR), n'ayant pas reçu de traitement préalable pour une maladie métastatique ou après échec d'une chimiothérapie à base d'irinotécan (voir rubrique « Propriétés pharmacodynamiques »).

L'irinotécan en association avec le 5-fluorouracile, l'acide folinique et le bevacizumab est indiqué dans le traitement de première ligne chez les patients atteints de cancer colorectal métastatique. L'irinotécan en association avec la capécitabine avec ou sans bevacizumab est indiqué en traitement de première ligne chez les patients présentant un cancer colorectal métastatique.

## Posologie et mode d'administration

### Posologie

**Réservé à l'adulte.**

La solution d'irinotécan doit être perfusée dans une veine périphérique ou centrale.

## **Posologie recommandée**

### *En monothérapie (chez les patients prétraités)*

La posologie recommandée est de 350 mg/m<sup>2</sup> administrés en perfusion intraveineuse de 30 à 90 minutes toutes les 3 semaines (voir rubriques « Mises en garde spéciales et précautions d'emploi » et « Précautions particulières d'élimination et de manipulation »).

### *En association (chez les patients non prétraités)*

L'efficacité et la tolérance de l'irinotécan en association avec le 5-fluorouracile (5-FU) et l'acide folinique (AF) ont été évaluées selon le schéma suivant (voir rubrique « Propriétés pharmacodynamiques ») :

- irinotécan et 5-FU/AF : schéma toutes les 2 semaines.

La dose recommandée est de 180 mg/m<sup>2</sup> d'irinotécan en perfusion intraveineuse de 30 à 90 minutes toutes les 2 semaines, suivie d'une perfusion d'acide folinique et de 5-fluorouracile.

Concernant la posologie et le mode d'administration de l'irinotécan administré en association avec le cetuximab, se référer au Résumé des Caractéristiques du Produit de ce médicament.

La dose d'irinotécan utilisée est généralement la même que celle administrée au cours des derniers cycles du précédent traitement à base d'irinotécan. L'irinotécan doit être administré au moins une heure après la fin de la perfusion du cetuximab.

Concernant la posologie et le mode d'administration du bévacizumab, se référer au Résumé des Caractéristiques du Produit de ce médicament.

Concernant la posologie et le mode d'administration de la capécitabine en association, se reporter à la rubrique « Propriétés pharmacodynamiques » et se référer aux rubriques appropriées du Résumé des Caractéristiques du Produit de ce médicament.

### *Ajustements posologiques*

L'irinotécan doit être administré après récupération convenable de tous les effets indésirables, c'est-à-dire grade 0 ou 1 selon les critères NCI-CTC (National Cancer Institute Common Toxicity Criteria) et après disparition complète d'une diarrhée liée au traitement.

Avant chaque administration du traitement, les doses d'irinotécan et de 5-FU si nécessaire, devront être réduites, en tenant compte des effets indésirables de plus haut grade observés et liés à l'administration précédente. Le traitement doit être retardé d'une ou deux semaines afin de permettre une récupération de tous les effets indésirables liés au traitement.

La posologie de chlorhydrate d'irinotécan et/ou de 5-FU si nécessaire, devra être réduite de 15 à 20% en cas de survenue des effets indésirables suivants :

- toxicité hématologique: neutropénie grade 4, neutropénie fébrile (neutropénie grade 3-4 et fièvre grade 2-4), thrombopénie et leucopénie (grade 4),
- toxicité non hématologique (grade 3- 4).

Les recommandations de modification de doses du cetuximab, administré en association avec l'irinotécan, doivent être en accord avec le Résumé des Caractéristiques du Produit du cetuximab.

En association avec la capécitabine: chez les patients âgés de 65 ans ou plus, une réduction de la posologie initiale de la capécitabine à 800 mg/m<sup>2</sup> deux fois par jour est recommandée, en accord avec le Résumé des Caractéristiques du Produit de ce médicament. Se référer aussi aux recommandations de modifications de doses lorsque la capécitabine est utilisée en association, dans le Résumé des Caractéristiques du Produit de ce médicament.

## **Durée du traitement**

Le traitement par l'irinotécan doit être poursuivi jusqu'à progression objective de la maladie ou apparition d'une toxicité inacceptable.

## **Populations à risque**

### *Patients présentant une insuffisance hépatique*

En monothérapie : la bilirubinémie (jusqu'à 3 fois la limite supérieure de la normale (LSN)), chez les patients ayant un indice de performance ≤ 2, conditionne la posologie initiale d'irinotécan.

Chez ces patients ayant une hyperbilirubinémie et un taux de prothrombine supérieur à 50%, la clairance de l'irinotécan est diminuée (voir rubrique « Propriétés pharmacocinétiques ») et le risque de toxicité hématopoïétique est donc augmenté.

Une surveillance hebdomadaire de la numération et de la formule sanguine doit alors être réalisée.

- Pour les patients ayant une bilirubinémie  $\leq 1,5$  fois la LSN, la dose recommandée de chlorhydrate d'irinotécan trihydraté est de 350 mg/m<sup>2</sup>.
- Pour les patients ayant une bilirubinémie comprise entre 1,5 et 3 fois la LSN, la dose recommandée de chlorhydrate d'irinotécan trihydraté est de 200 mg/m<sup>2</sup>.
- Pour les patients ayant une bilirubinémie  $> 3$  fois la LSN : l'irinotécan est contre indiqué (voir rubriques « Contre-indications » et « Mises en garde spéciales et précautions d'emploi »).
- Il n'y a pas de donnée disponible chez les patients présentant une insuffisance hépatique traités par l'irinotécan en association.

#### Patients présentant une insuffisance rénale

Aucune étude spécifique n'ayant été réalisée chez les insuffisants rénaux, l'irinotécan n'est pas recommandé chez les patients présentant une insuffisance rénale (voir rubriques « Mises en garde spéciales et précautions d'emploi » et « Propriétés pharmacocinétiques »).

#### Sujets âgés

Aucune étude pharmacocinétique spécifique n'a été réalisée chez le sujet âgé. Toutefois, la dose doit être choisie avec prudence dans cette population en raison de la fréquence plus importante de l'altération des fonctions biologiques. Cette population demande une surveillance plus étroite (voir rubrique « Mises en garde spéciales et précautions d'emploi »).

#### Population pédiatrique

La sécurité et l'efficacité de l'irinotécan chez les enfants n'ont pas encore été établies. Aucune donnée n'est disponible.

### **Mode d'administration**

#### *Précautions à prendre avant la manipulation ou l'administration du médicament*

Pour les instructions concernant la dilution du médicament avant administration, voir la rubrique « Précautions particulières d'élimination et de manipulation ».

### **Contre-indications**

- Maladie inflammatoire chronique de l'intestin et/ou avec une occlusion intestinale (voir rubrique « Mises en garde spéciales et précautions d'emploi »).
- Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients mentionnés à la rubrique « Liste des excipients »
- Allaitement (voir rubriques « Fertilité, grossesse et allaitement »).
- Bilirubinémie  $> 3$  fois la limite supérieure normale (LSN) (voir rubrique « Mises en garde spéciales et précautions d'emploi »).
- Insuffisance médullaire sévère.
- Indice de performance de grade OMS  $> 2$ .
- Association avec le millepertuis (voir rubrique « Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions »).
- Vaccins vivants atténués (voir rubrique « Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions »).

Pour les contre-indications d'utilisation de cetuximab, de bevacizumab ou de la capécitabine, se référer au Résumé des Caractéristiques du Produit de ces médicaments.

### **Mises en garde spéciales et précautions d'emploi**

|  |
|--|
| L'utilisation de l'irinotécan doit être réservée aux unités spécialisées dans l'administration de cytotoxiques et doit être uniquement administré sous le contrôle d'un médecin qualifié dans l'utilisation des chimiothérapies anticancéreuses. |
|--|

Étant donné la nature et la fréquence de survenue des effets indésirables, l'utilisation de l'irinotécan ne sera décidée qu'après avoir pesé les avantages attendus par rapport aux éventuels risques thérapeutiques dans les cas suivants :

- chez les patients présentant un facteur de risque notamment un indice de performance de grade OMS = 2 (ou un indice de KARNOFSKY < 50),
- dans les rares cas, où il est prévisible que le patient n'observera pas les recommandations de prise en charge des effets indésirables (nécessité d'un traitement antidiarrhéique immédiat et suffisamment prolongé et de la prise abondante de liquide dès qu'une diarrhée tardive apparaît). Un suivi strict du patient à l'hôpital est recommandé.

Lorsque l'irinotécan est utilisé en monothérapie, il est habituellement prescrit selon un schéma d'administration toutes les 3 semaines. Cependant, un schéma d'administration hebdomadaire (voir rubrique « PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES ») peut être envisagé chez des patients nécessitant un suivi plus rapproché ou qui ont un risque particulier de neutropénie sévère.

### **Diarrhée tardive**

Les patients doivent être avertis du risque de diarrhée tardive survenant plus de 24 heures après l'administration de l'irinotécan à tout moment de l'intercure.

En monothérapie, le délai médian d'apparition de la première selle liquide est de 5 jours après la perfusion de l'irinotécan. En cas d'apparition de cet effet indésirable, les patients doivent prévenir rapidement leur médecin et débiter immédiatement un traitement adapté.

Le risque de diarrhée est augmenté chez les patients ayant reçu une radiothérapie abdomino-pelvienne, chez les patients ayant une hyperleucocytose initiale, ceux avec un indice de performance de grade OMS  $\geq 2$  et chez les femmes. Si la diarrhée n'est pas traitée correctement, elle peut menacer le pronostic vital, particulièrement en cas de neutropénie concomitante.

Dès la première selle liquide, le patient doit boire abondamment des boissons riches en électrolytes et doit débiter immédiatement un traitement antidiarrhéique approprié. A cet effet, l'ordonnance de prescription de ce traitement antidiarrhéique sera établie dans le service où l'irinotécan a été administré. A sa sortie de l'hôpital, le patient devra se procurer le médicament prescrit afin de pouvoir traiter la diarrhée dès sa survenue. De plus, le patient doit informer le médecin ou le service ayant administré l'irinotécan de l'apparition de la diarrhée tardive.

Le traitement antidiarrhéique actuellement recommandé consiste en de fortes doses de lopéramide (4 mg lors de la première prise puis 2 mg toutes les 2 heures). Ce traitement doit être poursuivi au moins pendant 12 heures après la dernière selle liquide et sans modification de posologie. En aucun cas, le lopéramide ne doit être administré, à cette posologie, plus de 48 heures consécutives, en raison du risque d'ileus paralytique, ni moins de 12 heures.

Une antibiothérapie prophylactique à large spectre peut être associée au traitement antidiarrhéique dans les cas de diarrhée concomitante à une neutropénie sévère (nombre de neutrophiles < 500/mm<sup>3</sup>).

Une hospitalisation, associée à une antibiothérapie, est recommandée dans les cas suivants afin de contrôler la diarrhée :

- diarrhée accompagnée de fièvre,
- diarrhée sévère (demandant une réhydratation parentérale),
- diarrhée persistante après 48 heures de traitement à forte dose de lopéramide.

Le lopéramide ne doit pas être administré à titre prophylactique, même chez des patients ayant présenté une diarrhée tardive lors de cures précédentes.

Chez les patients ayant présenté une diarrhée tardive sévère, une réduction de la posologie est recommandée pour les cycles suivants (voir rubrique « Posologie et mode d'administration »).

### **Hématologie**

Au cours des essais cliniques, la fréquence des neutropénies de Grades 3 et 4, selon les critères NCI CTC, a été significativement plus élevée chez les patients qui avaient eu une radiothérapie pelvienne/abdominale préalable par rapport à ceux qui n'en avaient pas eue. Les patients dont les taux de base de bilirubine totale étaient supérieurs ou égal à 1,0 mg/dL ont également eu une plus

grande probabilité de survenue de neutropénies de Grade 3 ou 4 au cours du premier cycle par rapport à ceux dont les taux étaient inférieurs à 1,0 mg/dL.

Une surveillance hebdomadaire de l'hémogramme est recommandée pendant le traitement par l'irinotécan. Les patients doivent être avertis du risque de neutropénie et de l'importance de la présence d'une fièvre. Une neutropénie fébrile (température > 38°C et nombre de neutrophiles <1000/mm<sup>3</sup>) doit être traitée en urgence en milieu hospitalier, par des antibiotiques à large spectre par voie intraveineuse.

Chez les patients ayant eu une toxicité hématologique sévère, une réduction de dose est recommandée pour les administrations suivantes (voir rubrique « Posologie et mode d'administration »).

Chez les patients ayant une diarrhée sévère, le risque d'infection et de toxicité hématologique est augmenté. Un hémogramme doit être réalisé en cas de diarrhée sévère.

### **Insuffisance hépatique**

Avant la première administration d'irinotécan et avant chaque cycle, il est nécessaire de réaliser un bilan hépatique.

Une surveillance hebdomadaire de la numération sanguine doit être réalisée chez les patients ayant une bilirubinémie comprise entre 1,5 et 3 fois la LSN, en raison de la diminution de la clairance de l'irinotécan (voir rubrique « Propriétés pharmacocinétiques ») et de l'augmentation du risque d'hématotoxicité.

L'irinotécan ne doit pas être administré aux patients ayant une bilirubinémie > 3 fois la LSN (voir rubrique « Contre-indications »).

### **Nausées et vomissements**

Un traitement antiémétique prophylactique est recommandé avant chaque administration d'irinotécan. Des nausées et vomissements ont été fréquemment rapportés.

Les patients chez lesquels des vomissements sont associés à la diarrhée tardive, doivent être hospitalisés le plus rapidement possible.

### **Syndrome cholinergique aigu**

Si un syndrome cholinergique aigu apparaît (défini par une diarrhée précoce et un ensemble de signes et de symptômes tels que hypersudation, crampes abdominales, myosis, et hypersalivation) du sulfate d'atropine (0,25 mg par voie sous-cutanée) doit être administré en dehors de ses contre-indications cliniques (voir rubrique « Effets indésirables »). Ces symptômes peuvent être observés pendant ou peu de temps après la perfusion d'irinotécan, ils seraient liés à l'activité anticholinestérase du composé parent de l'irinotécan et sont attendus avec une survenue plus fréquente lors de l'administration de doses supérieures d'irinotécan.

Des précautions doivent être prises chez les patients asthmatiques.

Lorsqu'un syndrome cholinergique aigu a été observé lors de la première administration, l'utilisation de sulfate d'atropine à titre prophylactique est recommandée lors des administrations ultérieures d'irinotécan.

### **Troubles respiratoires**

La pneumopathie interstitielle avec infiltration pulmonaire est peu fréquente sous irinotécan. La pneumopathie interstitielle diffuse peut être fatale. Le risque de développement de pathologie pulmonaire interstitielle peut être favorisé par l'administration concomitante de médicaments pneumotoxiques, la radiothérapie, et l'administration de facteurs de croissance. Chez les patients présentant des facteurs de risques, la survenue de symptômes respiratoires devra être étroitement surveillée avant et pendant le traitement par l'irinotécan.

### **Extravasation**

Bien que l'irinotécan ne soit pas un vésicant connu, il convient de veiller à éviter toute extravasation et de surveiller le point de perfusion afin de déceler d'éventuels signes d'inflammation. En cas de survenue d'une extravasation, il est recommandé de nettoyer le site et d'appliquer de la glace.

### **Personnes âgées**

En raison de la fréquence plus élevée de l'altération des fonctions biologiques en particulier de la fonction hépatique chez les personnes âgées, le choix de la posologie doit être fait avec précaution dans cette population (voir rubrique « Posologie et mode d'administration »).

### **Maladie inflammatoire chronique intestinale et/ou occlusion intestinale**

Ces patients ne doivent pas être traités par l'irinotécan avant la résolution de l'occlusion intestinale (voir rubrique « Contre-indications »).

### **Fonction rénale**

Des augmentations de la créatininémie ou de l'azotémie ont été observées. Il y a eu des cas d'insuffisances rénales aiguës. Ces événements ont généralement été attribués à des complications d'infections ou à une déshydratation due aux nausées, aux vomissements ou à la diarrhée. De rares cas de dysfonctionnement rénal dus à un syndrome de lyse tumorale ont également été rapportés.

### **Radiothérapie**

Les patients ayant préalablement reçu une radiothérapie pelvienne/abdominale ont un risque accru de myélosuppression après administration d'irinotécan. Les médecins devront être prudents lors du traitement des patients ayant préalablement reçu une radiothérapie étendue (par ex >25% de moelle osseuse irradiée et dans les 6 semaines avant initiation du traitement par irinotécan). Des ajustements de posologie peuvent être applicables dans cette population (voir rubrique « Posologie et mode d'administration »).

### **Troubles cardiaques**

Des événements ischémiques myocardiques ont été observés après un traitement par l'irinotécan, principalement chez des patients présentant une maladie cardiaque sous-jacente ou d'autres facteurs de risque de maladie cardiaque, ou chez des patients ayant été soumis à une chimiothérapie cytotoxique antérieure (voir rubrique « Effets indésirables »).

Par conséquent, il conviendra d'exercer une surveillance étroite chez les patients présentant des facteurs de risque connus et de prendre les mesures nécessaires pour minimiser tous les facteurs de risque modifiables (par ex., tabac, hypertension et hyperlipidémie).

### **Troubles vasculaires**

L'irinotécan a rarement été associé à des événements thromboemboliques (embolie pulmonaire, thrombose veineuse et thromboembolie artérielle) chez les patients présentant des facteurs de risque multiples en plus du néoplasme sous-jacent.

### **Autres**

De rares cas d'insuffisance rénale, d'hypotension ou d'hypovolémie ont été observés chez des patients ayant présenté des épisodes de déshydratation associés à une diarrhée et/ou à des vomissements, ou à une infection. Les femmes en âge de procréer et les hommes doivent utiliser une contraception efficace, pendant et respectivement jusqu'à 1 mois et 3 mois après le traitement. L'irinotécan ne doit pas être administré de façon concomitante à de puissants inhibiteurs du cytochrome CYP450 3A4 (comme le kétoconazole) ou inducteurs (comme la rifampicine, la carbamazépine, le phénobarbital, la phénytoïne) (voir rubrique « Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions »).

Ce médicament est contre-indiqué chez les patients présentant une intolérance au fructose (maladie héréditaire rare).

## **Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions**

### **Associations contre-indiquées (voir rubrique « Contre-indications »)**

**+ Vaccin anti-tuberculeux** : Risque de maladie vaccinale généralisée mortelle.

**+ Millepertuis** : Diminution des concentrations plasmatiques de SN-38, le métabolite actif de l'irinotécan. Dans une étude pharmacocinétique avec un faible nombre de patients (n=5) dans laquelle l'irinotécan a été administré à la dose de 350 mg/m<sup>2</sup> avec 900 mg de millepertuis (*Hypericum perforatum*), une baisse de 42% des concentrations plasmatiques du SN-38, métabolite actif de l'irinotécan, a été observée. En conséquence, le millepertuis ne doit pas être administré avec l'irinotécan.

**+ Vaccins vivants atténués** : Risque de maladie vaccinale généralisée éventuellement mortelle. L'administration concomitante de vaccins vivants atténués durant le traitement par irinotécan et pendant 6 mois après l'arrêt du traitement de chimiothérapie est contre-indiquée. Des vaccins tués ou inactivés peuvent être administrés, cependant la réponse à ces vaccins peut être diminuée.

**Associations déconseillées (voir rubrique « Mises en garde spéciales et précautions d'emploi »)**

L'administration concomitante d'irinotécan avec de puissants inhibiteurs ou inducteurs du cytochrome P450 3A4 (CYP3A4) peut altérer le métabolisme de l'irinotécan et doit être évitée (voir rubrique « Mises en garde spéciales et précautions d'emploi ») :

**Médicaments inducteurs puissants du CYP3A4 et/ou de l'UGT1A1** : (par ex. rifampicine, carbamazépine, phénobarbital ou phénytoïne) :

Risque de réduction de l'exposition à l'irinotécan, au SN-38 et au SN-38 glucuronidé et de réduction des effets pharmacodynamiques. Plusieurs études ont montré que l'administration concomitante d'antiépileptiques inducteurs de CYP3A entraîne une exposition réduite à l'irinotécan, au SN-38 et au SN-38 glucuronidé et réduit les effets pharmacodynamiques. Les effets de tels anti-convulsivants se sont traduits par une diminution de 50 % ou plus de l'ASC de SN-38 et SN-38G. En plus de l'induction des enzymes du CYP3A4, l'augmentation de la glucuronidation et de l'excrétion biliaire peut jouer un rôle dans la réduction de l'exposition à l'irinotécan et ses métabolites. De plus, avec la phénytoïne : risque d'exacerbation des convulsions résultant de la diminution de l'absorption digestive de la phénytoïne du fait du médicament cytotoxique.

**Inhibiteurs puissants du CYP3A4** : (par ex. kétoconazole, itraconazole, voriconazole, posaconazole, inhibiteurs de protéase, clarithromycine, érythromycine, télichromycine) :

Une étude a montré que l'administration concomitante de kétoconazole, comparée à l'irinotécan seul, a entraîné une diminution de 87 % de l'ASC de l'APC et une augmentation de 109 % de l'ASC de SN-38.

**Inhibiteurs de l'UGT1A1** : (par ex. atazanavir, kétoconazole, régorafénib)

Risque d'augmentation de l'exposition systémique au SN-38, le métabolite actif de l'irinotécan. Les médecins doivent en tenir compte si l'association ne peut être évitée.

**Autres inhibiteurs du CYP3A4** : (par ex. crizotinib, idélalisib)

Risque d'augmentation de la toxicité de l'irinotécan en raison d'une diminution du métabolisme de l'irinotécan par le crizotinib ou l'idélalisib.

**Précautions d'emploi**

**Antagonistes de la vitamine K** : risque accru d'hémorragies et d'événements thrombotiques au cours des maladies tumorales. Si des antagonistes de la vitamine K sont indiqués, le bilan de l'INR (International Normalised Ratio) devra être pratiqué plus fréquemment.

**Associations à prendre en compte**

**Agents immunosuppresseurs** : (par ex. Ciclosporine, Tacrolimus) : immunosuppression excessive avec risque de lymphoprolifération.

**Agents bloquants neuromusculaires** : l'interaction entre l'irinotécan et les agents bloquants neuromusculaires ne peut pas être exclue. Du fait de l'activité anticholinestérase de l'irinotécan, les médicaments avec une activité anticholinestérase peuvent prolonger les effets bloquants neuromusculaires du suxaméthonium et le blocage neuromusculaire d'agents non dépolarisants peut être antagonisé.

**Autres associations**

**5-fluorouracile /acide folinique** : l'administration concomitante de 5-fluorouracile/d'acide folinique dans le schéma d'association ne modifie pas les paramètres pharmacocinétiques de l'irinotécan.

**Bévacizumab** : les résultats d'une étude d'interaction médicamenteuse dédiée n'ont démontré aucun effet significatif du bévacizumab sur la pharmacocinétique de l'irinotécan et de son métabolite actif SN-38. Cependant, cela n'exclut pas une augmentation de la toxicité en raison de leurs propriétés pharmacologiques.

**Cétuximab** : L'influence de l'irinotécan sur le profil de tolérance du cetuximab, et *vice-versa*, n'a pas été mis en évidence.

## **Fertilité, grossesse et allaitement**

### **Femmes en âge de procréer / Contraception chez les hommes et les femmes**

Les femmes en âge de procréer ainsi que les hommes doivent utiliser une contraception efficace alors qu'ils reçoivent de l'irinotécan, et ce jusqu'à 1 mois et 3 mois respectivement après la fin du traitement.

### **Grossesse**

Il n'y a aucune information concernant l'utilisation de l'irinotécan chez la femme enceinte. Chez l'animal, des effets embryotoxiques et tératogènes ont été observés. Aussi, au vu des résultats des études chez l'animal et du mécanisme d'action de l'irinotécan, l'irinotécan ne doit pas être utilisé pendant la grossesse sauf si le traitement s'avère indispensable (voir rubriques « Contre-indications » et « Mises en garde spéciales et précautions d'emploi »).

### **Allaitement**

Chez les rats qui allaitent, l'irinotécan marqué au C14 a été détecté dans le lait. Il n'existe pas de données relatives au passage de l'irinotécan dans le lait maternel humain. En conséquence, en raison du risque potentiel de manifestations indésirables chez le nourrisson, l'allaitement doit être interrompu pendant la durée du traitement par l'irinotécan (voir rubrique « Contre-indications »).

### **Fertilité**

Il n'y a pas de données disponibles sur l'effet de l'irinotécan sur la fertilité chez l'homme. Chez l'animal, les effets indésirables de l'irinotécan sur la fertilité a été documentée (voir rubrique « Données de sécurité préclinique »).

## **Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines**

L'irinotécan a une influence modérée sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Les patients doivent être avertis du risque potentiel de vertiges ou de troubles visuels pouvant se produire dans les 24 heures après l'administration du produit et doivent éviter la conduite de véhicule ou l'utilisation d'une machine si de tels symptômes apparaissent.

## **Effets indésirables**

### **ESSAIS CLINIQUES**

Les données sur les effets indésirables sont principalement issues des essais cliniques dans le cancer colorectal métastatique ; les fréquences sont présentées ci-dessous. Il est attendu que les effets indésirables dans les autres indications soient similaires à ceux décrits dans le cancer colorectal.

Les effets indésirables dose-limitants les plus fréquents ( $\geq 1/10$ ) sont la diarrhée tardive (survenant plus de 24 heures après l'administration) et les troubles hématologiques dont la neutropénie, l'anémie et la thrombocytopénie.

La neutropénie constitue une toxicité dose limitante. La neutropénie était réversible et non cumulative ; le délai médian d'apparition du nadir était de 8 jours que ce soit en monothérapie ou en association.

Un syndrome cholinergique aigu transitoire sévère a été très fréquemment observé.

Les principaux symptômes ont été une diarrhée précoce et d'autres symptômes variés tels que douleur abdominale, sudation, myosis et salivation excessive survenant pendant ou dans les 24 heures suivant l'administration de l'irinotécan. Les symptômes disparaissent à l'administration d'atropine (voir rubrique « Mises en garde spéciales et précautions d'emploi »).

### **MONOTHERAPIE**

Les effets indésirables suivants possiblement ou probablement liés à l'administration d'irinotécan ont été analysés sur une population de 765 patients à la dose recommandée de 350 mg/m<sup>2</sup> en monothérapie.



Dans chaque groupe de fréquence, les effets indésirables sont présentés par ordre décroissant de gravité. Les fréquences sont définies comme : très fréquent ( $\geq 1/10$ ), fréquent ( $\geq 1/100$  à  $< 1/10$ ), peu fréquent ( $\geq 1/1000$  à  $< 1/100$ ), rare ( $\geq 1/10000$  à  $< 1/1000$ ), et très rare ( $< 1/10000$ ).

| <b>Effets indésirables rapportés avec l'irinotécan en monothérapie (350 mg/m<sup>2</sup> toutes les 3 semaines)</b> |                  |   |
|---|------------------|---|
| <b>Classes de systèmes d'organes MedDRA</b>   | <b>Fréquence</b> | <b>Terme préférentiel</b>                         |
| Infections et infestations  | Fréquent         | Infection   |
| Affections hématologiques et du système lymphatique   | Très fréquent    | Neutropénie                                       |
|   | Très fréquent    | Anémie  |
|   | Fréquent         | Thrombocytopénie                                  |
|   | Fréquent         | Neutropénie fébrile                               |
| Troubles du métabolisme et de la nutrition  | Très fréquent    | Diminution de l'appétit                           |
| Affections du système nerveux   | Très fréquent    | Syndrome cholinergique                            |
| Affections gastro-intestinales  | Très fréquent    | Diarrhée  |
|   | Très fréquent    | Vomissements                                      |
|   | Très fréquent    | Nausées   |
|   | Très fréquent    | Douleur abdominale                                |
|   | Fréquent         | Constipation                                      |
| Affections de la peau et du tissu sous-cutané   | Très fréquent    | Alopécie (réversible)                             |
| Troubles généraux et anomalies au site d'administration   | Très fréquent    | Inflammation des muqueuses                        |
|   | Très fréquent    | Pyrexie   |
|   | Très fréquent    | Asthénie  |
| Investigations  | Fréquent         | Augmentation de la créatininémie                  |
|   | Fréquent         | Augmentation des transaminases (ALAT et ASAT)     |
|   | Fréquent         | Augmentation de la bilirubine sanguine            |
|   | Fréquent         | Augmentation des phosphatases alcalines sanguines |

### **Description de certains effets indésirables (monothérapie)**

#### **Diarrhée sévère**

Une diarrhée sévère est observée chez 20% des patients qui ont suivi les recommandations de prise en charge de la diarrhée. Une diarrhée sévère est retrouvée dans 14% des cycles évaluable. Le délai médian d'apparition de la première selle liquide est de 5 jours après la perfusion d'Irinotecan.

#### **Nausées et vomissements**

Des nausées et vomissements sévères sont observés chez environ 10 % des patients ayant reçu un traitement antiémétique.

#### **Constipation**

Une constipation a été observée chez moins de 10 % des patients.

#### **Neutropénie**

La neutropénie est observée chez 78,7 % des patients et est sévère (nombre de neutrophiles < 500/mm<sup>3</sup>) chez 22,6 % des patients. Parmi les cycles évaluable, 18 % se compliquent d'une neutropénie < 1000/mm<sup>3</sup> dont 7,6 % d'une neutropénie < 500/mm<sup>3</sup>.

La récupération totale est en général atteinte le 22<sup>ème</sup> jour.

Une **neutropénie fébrile** est rapportée chez 6,2 % des patients et dans 1,7 % des cycles.

Des infections sont survenues chez environ 10,3 % des patients (2,5 % des cycles) et ont été associées à une neutropénie sévère chez environ 5,3 % des patients (1,1 % des cycles), et ont entraîné 2 décès.

### **Anémie**

Une anémie a été rapportée chez environ 58,7 % des patients (8 % avec une hémoglobine < 8 g/dl et 0,9% avec une hémoglobine < 6,5 g/dl).

### **Thrombocytopénie**

Une thrombocytopénie (< 100 000/mm<sup>3</sup>) a été observée chez 7,4 % des patients et 1,8 % des cycles dont 0,9 % des patients avec des plaquettes ≤ 50 000 /mm<sup>3</sup>, soit 0,2 % des cycles.

Presque tous les patients ont normalisé leur numération plaquettaire le 22<sup>ème</sup> jour.

### **Syndrome de type cholinergique**

Un syndrome de type cholinergique aigu, transitoire et sévère est observé chez 9 % des patients traités par monothérapie.

### **Asthénie**

L'asthénie sévère est observée chez moins de 10 % des patients traités par monothérapie. Le lien de causalité dû à l'irinotécan n'est pas clairement établi.

### **Pyrexie**

Une pyrexie isolée non accompagnée d'infection ou de neutropénie sévère est survenue chez 12 % des patients traités par monothérapie.

### **Examens biologiques**

Une augmentation transitoire légère à modérée des taux sanguins des transaminases, des phosphatases alcalines, ou de la bilirubine est observée respectivement chez 9,2%, 8,1% et 1,8% des patients, en l'absence de progression des métastases hépatiques.

Une augmentation transitoire légère à modérée de la créatininémie est observée chez 7,3% des patients.

### **EN ASSOCIATION**

Les effets indésirables détaillés dans ce paragraphe concernent l'irinotécan.

Aucune influence du cetuximab sur le profil de tolérance de l'irinotécan, et vice versa n'a été mise en évidence. En association avec le cetuximab, d'autres effets indésirables ont été rapportés et étaient ceux attendus avec le cetuximab (comme dermatite acnéiforme chez 88% des patients). Par conséquent, pour les effets indésirables de l'irinotécan en association avec le cetuximab, se référer au Résumé des Caractéristiques du Produit.

Les effets indésirables rapportés chez les patients traités par la capécitabine en association avec l'irinotécan, en plus de ceux observés avec la capécitabine en monothérapie ou observés à une fréquence supérieure comparée à la capécitabine en monothérapie sont :

- Très fréquents, tous grades : thrombose / embolie ;
- Fréquents, tous grades : hypersensibilité, ischémie myocardique/ infarctus ;
- Fréquents, grades 3 et 4 : neutropénie fébrile.

Se référer au Résumé des Caractéristiques du Produit de la capécitabine pour des informations complètes sur les effets indésirables de ce médicament.

Les effets indésirables de grade 3 et de grade 4 rapportés chez les patients traités par la capécitabine en association avec l'irinotécan et le bévacicumab, en plus de ceux observés avec la capécitabine en

monothérapie ou observés à une fréquence supérieure comparée à la capécitabine en monothérapie sont :

- Fréquents, grades 3 et 4 : neutropénie, thrombose / embolie, hypertension, et ischémie cardiaque / infarctus.

Se référer aux Résumés des caractéristiques du Produit de la capécitabine et du bévacizumab pour des informations complètes sur les effets indésirables de ces médicaments.

L'hypertension de Grade 3 était la principale toxicité significative liée à l'ajout du bévacizumab au bolus Irinotécan/5-FU/FA. De plus, il y a eu une légère augmentation des diarrhées et des leucopénies de Grade 3/4 avec l'association par rapport aux patients recevant le bolus irinotécan/5-FU/FA seul.

Se référer au Résumé des Caractéristiques du Produit du bévacizumab pour les informations relatives aux effets indésirables en association avec ce médicament.

L'irinotécan a été étudié en association avec le 5-FU et FA dans le cancer colorectal métastatique.

Les données de sécurité issues des essais cliniques démontrent une survenue très fréquente d'effets indésirables de Grades 3 ou 4 selon les critères NCI, possiblement ou probablement liés au sein des classes de systèmes d'organes MedDRA suivants : affections hématologiques et du système lymphatique, affections gastro-intestinales, et affections de la peau et du tissu sous-cutané.

Les effets indésirables suivants sont considérés comme possiblement ou probablement liés à l'administration de l'irinotécan et ont été rapportés chez 145 patients traités par l'irinotécan en association avec 5-FU/AF administré toutes les 2 semaines à la dose recommandée de 180 mg/m<sup>2</sup>.

| <b>Effets indésirables rapportés avec l'irinotécan en association (schéma de 180 mg/m<sup>2</sup> toutes les 2 semaines)</b> |                  |   |
|--|------------------|---|
| <b>Classes de systèmes d'organes MedDRA</b>  | <b>Fréquence</b> | <b>Terme préférentiel</b>                     |
| Infections et infestations   | Fréquent         | Infection                                     |
| Affections hématologiques et du système lymphatique  | Très fréquent    | Thrombocytopénie                              |
|  | Très fréquent    | Neutropénie                                   |
|  | Très fréquent    | Anémie  |
|  | Fréquent         | Neutropénie fébrile                           |
| Troubles du métabolisme et de la nutrition   | Très fréquent    | Diminution de l'appétit                       |
| Affections du système nerveux  | Très fréquent    | Syndrome cholinergique                        |
| Affections gastro-intestinales   | Très fréquent    | Diarrhée                                      |
|  | Très fréquent    | Vomissements                                  |
|  | Très fréquent    | Nausées                                       |
|  | Fréquent         | Douleur abdominale                            |
|  | Fréquent         | Constipation                                  |
| Affections de la peau et du tissu sous-cutané  | Très fréquent    | Alopécie (réversible)                         |
| Troubles généraux et anomalies au site d'administration  | Très fréquent    | Inflammation des muqueuses                    |
|  | Très fréquent    | Asthénie                                      |
|  | Fréquent         | Pyrexie                                       |
| Investigations   | Très fréquent    | Augmentation des transaminases (ALAT et ASAT) |
|  | Très fréquent    | Augmentation de la bilirubine sanguine        |

|  |               |   |
|--|---------------|---|
|  | Très fréquent | Augmentation des phosphatases alcalines sanguines |
|--|---------------|---|

### **Description de certains effets indésirables (en association)**

#### **Diarrhée sévère**

Une diarrhée sévère est observée chez 13,1% des patients qui ont suivi les recommandations de prise en charge de la diarrhée. Une diarrhée sévère est retrouvée dans 3,9% des cycles évaluable.

#### **Nausées et vomissements**

Une incidence moindre des nausées et vomissements sévères est observée (respectivement 2,1% et 2,8% des patients).

#### **Constipation**

Une constipation relative à l'irinotécan et/ou au loperamide est observée chez 3,4% des patients traités.

#### **Neutropénie**

Une neutropénie est observée chez 82,5 % des patients et est sévère (nombre de neutrophiles < 500/mm<sup>3</sup>) dans 9,8 % des cas. Parmi les cycles évaluable, 67,3 % se compliquent d'une neutropénie < 1000/mm<sup>3</sup> dont 2,7 % d'une neutropénie < 500/mm<sup>3</sup>. La récupération totale est en général atteinte dans les 7 à 8 jours.

Une **neutropénie fébrile** est rapportée chez 3,4 % des patients et dans 0,9 % des cycles.

Des **infections** sont survenues chez environ 2 % des patients (0,5 % des cycles), ont été associées à une neutropénie sévère chez environ 2,1 % des patients (0,5 % des cycles), et ont entraîné 1 décès.

#### **Anémie**

Une anémie a été rapportée chez environ 97,2% des patients (2,1% avec une hémoglobine < 8 g/dl).

#### **Thrombocytopénie**

Une thrombocytopénie (< 100000/mm<sup>3</sup>) a été observée chez 32,6% des patients et 21,8% des cycles. Aucune thrombocytopénie sévère n'a été observée (< 50000 mm<sup>3</sup>).

#### **Syndrome cholinergique aigu :**

Un syndrome de type cholinergique aigu, transitoire et sévère est observé chez 1,4% des patients traités par association.

#### **Asthénie**

L'asthénie sévère est observée chez 6,2 % des patients traités par association. Le lien de causalité dû à l'irinotécan n'est pas clairement établi.

#### **Pyrexie sans infection**

Une pyrexie isolée non accompagnée d'infection ou de neutropénie sévère est survenue chez 6,2% des patients traités par association.

#### **Examens biologiques**

En association, une élévation sérique transitoire (grade 1 et 2) des ALAT, ASAT, phosphatases alcalines ou bilirubine a été observée chez 15%, 11%, 11% et 10% des patients respectivement, en l'absence de progression des métastases hépatiques. Des grades 3 transitoires ont été observés chez 0%, 0%, 0% et 1% des patients respectivement. Aucun grade 4 n'a été observé.

Dans de très rares cas, une élévation de l'amylase sérique et/ou de la lipase sérique a été rapportée.

De rares cas d'hypokaliémie et d'hyponatrémie principalement liées à une diarrhée et des vomissements ont été rapportés.

### **AUTRES EFFETS INDESIRABLES RAPPORTES DANS LES ESSAIS CLINIQUES AVEC L'IRINOTECAN EN SCHEMA HEBDOMADAIRE**

Les effets additionnels suivants liés au médicament ont été rapportés dans les essais cliniques avec irinotécan : douleur, sepsis, trouble anorectal, candidose gastro-intestinale, hypomagnésémie, rash,

signes cutanés, troubles de la démarche, confusion, céphalée, syncope, rougeur, bradycardie, infection du tractus urinaire, douleur à la poitrine, gamma-glutamyltransférase augmentée, extravasation, syndrome de lyse tumorale, affections cardiovasculaires (angor, arrêt cardiaque, infarctus du myocarde, ischémie myocardique, trouble vasculaire périphérique, trouble vasculaire) et événements thromboemboliques (thrombose artérielle, infarctus cérébral, accident vasculaire cérébral, thrombose veineuse profonde, embolie artérielle périphérique, embolie pulmonaire, thrombophlébite, thrombose et mort soudaine) (voir rubrique « Mises en garde spéciales et précautions d'emploi »).

## SURVEILLANCE APRES COMMERCIALISATION

Les fréquences issues de la surveillance après commercialisation ne sont pas connues (ne peuvent être estimées sur la base des données disponibles).

| <b>Classes de systèmes d'organes MedDRA</b>            | <b>Terme préférentiel</b>  |
|--|--|
| Infections et infestations                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colite pseudomembraneuse dont un cas documenté au niveau bactériologique (<i>Clostridium difficile</i>)</li> <li>• Sepsis</li> </ul>  |
| Affections hématologiques et du système lymphatique    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thrombocytopénie avec anticorps anti-plaquettaires</li> </ul>   |
| Affections du système immunitaire                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hypersensibilité</li> <li>• Réaction anaphylactique</li> </ul>  |
| Troubles du métabolisme et de la nutrition             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Déshydratation (en raison de la diarrhée et des vomissements)</li> <li>• Hypovolémie</li> </ul>   |
| Affections du système nerveux                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trouble de la parole généralement transitoire en nature, dans certains cas, l'évènement a été attribué au syndrome cholinergique observé pendant ou peu de temps après la perfusion d'irinotécan</li> <li>• Paresthésie</li> <li>• Contractions musculaires involontaires</li> </ul>  |
| Affections cardiaques                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hypertension (pendant ou après la perfusion)</li> <li>• Collapsus cardio-vasculaire*</li> </ul>   |
| Troubles vasculaires                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hypotension*</li> </ul>   |
| Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pneumopathie interstitielle diffuse se présentant comme une infiltration pulmonaire, peu fréquente pendant la thérapie avec irinotécan ; des effets précoces tels que des dyspnées ont été rapportés (voir rubrique « Mises en garde spéciales et précautions d'emploi »).</li> <li>• Dyspnée (voir rubrique « Mises en garde spéciales et précautions d'emploi »)</li> <li>• Hoquets</li> </ul>  |
| Affections gastro-intestinales                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obstruction intestinale</li> <li>• Iléus : des cas d'iléus sans colite préalable ont aussi été rapportés</li> <li>• Mégacolon</li> <li>• Hémorragie gastro-intestinale</li> <li>• Colite, dans certains cas, la colite est compliquée d'ulcération, de saignement, d'un iléus ou d'une infection</li> <li>• Typhlite</li> <li>• Colite ischémique</li> <li>• Colite ulcéreuse</li> <li>• Enzymes pancréatiques augmentées symptomatique ou asymptomatique</li> <li>• Perforation intestinale</li> </ul> |

| <b>Classes de systèmes d'organes MedDRA</b>             | <b>Terme préférentiel</b>  |
|---|--|
| Troubles hépatobiliaires                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stéatohépatite</li> <li>• Stéatose hépatique</li> </ul>   |
| Affections de la peau et du tissu sous-cutané           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réaction cutanée</li> </ul>   |
| Affections musculo-squelettiques et systémiques         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Crampes</li> </ul>  |
| Affections du rein et des voies urinaires               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dysfonctionnement rénal et insuffisance rénale aiguë généralement chez les patients chez qui survient une infection et/ou de volume faible en raison de toxicités gastro-intestinales sévères*</li> <li>• Insuffisance rénale*</li> </ul>   |
| Troubles généraux et anomalies au site d'administration | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réaction au site de perfusion</li> </ul>  |
| Investigations  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Amylase augmentée</li> <li>• Augmentation de la lipase</li> <li>• Hypokaliémie</li> <li>• Hyponatrémie principalement liée à la diarrhée et aux vomissements</li> <li>• Transaminases augmentées (i.e. ASAT et ALAT) en l'absence de métastases hépatiques progressives très rarement rapportées</li> </ul> |

\*De rares cas d'insuffisance rénale, d'hypotension ou de collapsus cardio-vasculaire ont été observés chez des patients ayant présenté des épisodes de déshydratation associés à une diarrhée et/ou des vomissements, ou un sepsis.

### **Déclaration des effets indésirables suspectés**

La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : [www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr).

## **Surdosage**

### **Symptômes**

Des cas de surdosages pouvant être fatals à des doses supérieures approximativement à deux fois la dose thérapeutique recommandée, ont été rapportés.

Les effets indésirables les plus fréquents ont été les neutropénies sévères et les diarrhées sévères.

### **Prise en charge**

Il n'existe aucun antidote connu en cas de surdosage par Irinotécan.

Par conséquent, en cas de surdosage, il est recommandé de prévenir la déshydratation causée par la diarrhée et de traiter les complications infectieuses.

## **PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES**

### **Propriétés pharmacodynamiques**

**Classe pharmacothérapeutique : Cytotoxique inhibiteur de la topoisomérase I, code ATC : L01XX19 (L: anticancéreux et immunosuppresseur)**

### **Mécanisme d'action**

## Données précliniques

L'irinotécan est un dérivé hemi-synthétique de l'irinotécan thécine. Il s'agit d'un agent antinéoplasique qui agit comme inhibiteur spécifique de l'ADN topoisomérase I. L'irinotécan est métabolisé par la carboxylestérase dans la plupart des tissus en un métabolite actif, le SN-38 qui s'est révélé plus actif que l'irinotécan sur la topoisomérase I purifiée et plus cytotoxique sur plusieurs lignées de cellules tumorales murines ou humaines. L'inhibition de l'ADN topoisomérase I par l'irinotécan ou le SN-38 induit des lésions simple-brin de l'ADN qui bloquent la fourche de réplication de l'ADN et sont responsables de l'activité cytotoxique. Celle-ci est fonction du temps du contact avec les cellules et est spécifique de la phase S.

*In vitro*, l'irinotécan et le SN-38 ne sont pas significativement reconnus par la P-glycoprotéine MDR et exercent des effets cytotoxiques sur des lignées cellulaires résistantes à la doxorubicine et à la vinblastine.

Par ailleurs, l'irinotécan possède un large spectre d'activité antitumorale expérimentale *in vivo* sur les tumeurs murines (adénocarcinome du canal pancréatique PO3, adénocarcinome mammaire MA 16/C, adénocarcinomes coliques C38 et C51) et sur des xénogreffes humaines (adénocarcinome colique Co-4, adénocarcinome mammaire Mx-1, adénocarcinomes gastriques ST-15 et SC-16). L'irinotécan est également actif sur des tumeurs murines exprimant la P-glycoprotéine MDR (leucémies P388 résistants à la vincristine ou à la doxorubicine).

**Le principal effet pharmacologique de l'irinotécan non lié à son activité antitumorale est l'inhibition de l'acétylcholinestérase.**

## Données cliniques

### Traitement associé en première ligne du cancer colorectal métastatique

#### En association avec l'acide folinique et le 5-fluorouracile :

Un essai de phase III a été réalisé chez 385 patients non prétraités pour un cancer colorectal métastatique recevant soit un schéma d'administration toutes les 2 semaines, (voir rubrique « Posologie et mode d'administration »), soit un schéma d'administration hebdomadaire. Dans le schéma toutes les 2 semaines, au jour 1, l'administration de l'irinotécan à la dose de 180 mg/m<sup>2</sup> une fois toutes les 2 semaines est suivie d'une perfusion d'acide folinique (200 mg/m<sup>2</sup> en perfusion de 2 heures) et de 5-fluorouracile (400 mg/m<sup>2</sup> en bolus suivi par 600 mg/m<sup>2</sup> en perfusion de 22 heures).

Au jour 2, l'acide folinique et le 5-fluorouracile sont administrés aux mêmes doses et selon le même schéma. Dans le schéma hebdomadaire, l'administration de l'irinotécan à la dose de 80 mg/m<sup>2</sup> est suivie d'une perfusion d'acide folinique (500 mg/m<sup>2</sup> en perfusion de 2 heures), puis de 5-fluorouracile (2300 mg/m<sup>2</sup> en perfusion de 24 heures) pendant 6 semaines.

Dans l'essai d'association selon les 2 schémas décrits ci-dessus, l'efficacité de l'irinotécan a été évaluée chez 198 patients.

|   | Résultats globaux (n=198) |          | Schéma hebdomadaire (n=50) |          | Schéma toutes les 2 semaines (n=148) |          |
|---|---------------------------|----------|----------------------------|----------|--------------------------------------|----------|
|   | irinotécan 5FU/AF         | + 5FU/AF | irinotécan 5FU/AF          | + 5FU/AF | irinotécan 5FU/AF                    | + 5FU/AF |
| Taux de réponse (%)                                     | 40,8*                     | 23,1*    | 51,2*                      | 28,6*    | 37,5*                                | 21,6*    |
| p   | p<0,001                   |          | p=0,045                    |          | p=0,005                              |          |
| Temps médian jusqu'à progression (mois)                 | 6,7                       | 4,4      | 7,2                        | 6,5      | 6,5                                  | 3,7      |
| p   | p<0,001                   |          | NS                         |          | p=0,001                              |          |
| Durée médiane des réponses (mois)                       | 9,3                       | 8,8      | 8,9                        | 6,7      | 9,3                                  | 9,5      |
| p   | NS                        |          | p=0,043                    |          | NS                                   |          |
| Durée médiane des réponses et des stabilisations (mois) | 8,6                       | 6,2      | 8,3                        | 6,7      | 8,5                                  | 5,6      |
| p   | p<0,001                   |          | NS                         |          | p=0,003                              |          |
| Temps médian jusqu'à échec du                           | 5,3                       | 3,8      | 5,4                        | 5,0      | 5,1                                  | 3,0      |

|                               |          |      |      |      |         |      |
|-------------------------------|----------|------|------|------|---------|------|
| traitement (mois)             |          |      |      |      |         |      |
| p                             | p=0,0014 |      | NS   |      | p<0,001 |      |
| Survie globale médiane (mois) | 16,8     | 14,0 | 19,2 | 14,1 | 15,6    | 13,0 |
| p                             | p=0,028  |      | NS   |      | p=0,041 |      |

5FU: 5-fluorouracile

AF: acide folinique

NS: non significatif

\*: sur patients évaluable

Dans le schéma hebdomadaire, l'incidence des diarrhées sévères est de 44,4% chez les patients traités par l'irinotécan en association avec 5FU/AF et 25,6% chez les patients traités par 5FU/AF seul.

L'incidence des neutropénies sévères (nombre de neutrophiles < 500/mm<sup>3</sup>) est de 5,8% chez les patients traités par l'irinotécan en association avec 5FU/AF et 2,4% chez les patients traités par 5FU/AF seul.

De plus, le temps médian de détérioration définitive du Performance Status est significativement plus long dans le groupe l'irinotécan en association que dans le groupe 5FU/AF seul (p=0,046).

La qualité de vie a été évaluée dans cet essai de phase III à l'aide du questionnaire EORTC QLQ-C30. La détérioration définitive survient constamment plus tardivement dans les groupes irinotécan. L'évolution du score global de Qualité de vie est légèrement meilleure dans le groupe irinotécan en association bien que non significative, montrant que l'irinotécan est efficace en association tout en conservant la qualité de vie.

#### **En association avec le bévacizumab :**

Une étude de phase III, randomisée, en double aveugle, contrôlée, a évalué le bévacizumab en association à une chimiothérapie l'irinotécan/5FU/AF en traitement de première ligne du cancer colorectal métastatique (étude AVF2107g). L'addition du bévacizumab à l'association l'irinotécan /5FU/AF a conduit à une augmentation statistiquement significative de la survie globale. Le bénéfice clinique, évalué par la survie globale, a été constaté dans toutes les sous populations de patients déterminées en fonction de l'âge, du sexe, de l'indice de performance, de la localisation de la tumeur primitive, du nombre d'organes atteints et de la durée de la maladie métastatique. Se référer également au résumé des caractéristiques du produit du bévacizumab. Les résultats d'efficacité de l'étude AVF2107g sont présentés dans le tableau suivant :

|   | AVF2107g                  |  |
|---|---------------------------|--|
|   | Groupe 1<br>IFL + placebo | Groupe 2<br>IFL + Avastin <sup>a</sup> |
| <b>Nombre de patients</b>                           | 411                       | 402                                    |
| <b>Survie globale</b>                               |                           |  |
| Temps médian (mois)                                 | 15,6                      | 20,3                                   |
| Intervalle de confiance à 95% (IC 95%)              | 14,29 – 16,99             | 18,46 – 24,18                          |
| Risque relatif <sup>b</sup>                         |                           | 0,660                                  |
| p   |                           | 0,00004                                |
| <b>Survie sans progression</b>                      |                           |  |
| Temps médian (mois)                                 | 6,2                       | 10,6                                   |
| Risque relatif                                      |                           | 0,54                                   |
| p   |                           | < 0,0001                               |
| <b>Taux de réponse global</b>                       |                           |  |
| Taux (%)  | 34,8                      | 44,8                                   |
| IC 95%  | 30,2 - 39,6               | 39,9 – 49,8                            |
| p   |                           | 0,0036                                 |
| <b>Durée de réponse</b>                             |                           |  |
| Temps médian (mois)                                 | 7,1                       | 10,4                                   |
| 25 <sup>e</sup> – 75 <sup>e</sup> percentile (mois) | 4,7 – 11,8                | 6,7 – 15,0                             |

<sup>a</sup> 5 mg/kg toutes les 2 semaines.

<sup>b</sup> Par rapport au groupe témoin.



### **En association avec le cétuximab**

EMR 62 202-013: cette étude randomisée, menée chez des patients atteints de cancer colorectal métastatique n'ayant pas reçu de traitement préalable pour leur maladie métastatique, a comparé l'association du cétuximab et de l'irinotécan plus une perfusion de 5-fluoro-uracile/acide folinique (5-FU/AF) (599 patients) avec cette même chimiothérapie en monothérapie (599 patients). Sur l'ensemble de la population des patients pour lesquels le statut du gène KRAS était évaluable, 64% présentaient des tumeurs avec gène KRAS de type sauvage.

Les données d'efficacité générées par cette étude sont résumées dans le tableau suivant :

| Variable/ statistique | Population totale              |                   | Patients avec gène KRAS de type sauvage |                   |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------|---|-------------------|
|                       | Cétuximab plus FOLFIRI (N=599) | FOLFIRI (N=599)   | Cétuximab plus FOLFIRI (N=172)          | FOLFIRI (N=176)   |
| <b>ORR</b>            |                                |                   |   |                   |
| % (IC 95%)            | 46.9 (42.9, 51.0)              | 38.7 (34.8, 42.8) | 59.3 (51.6, 66.7)                       | 43.2 (35.8, 50.9) |
| Valeur de p           | 0.0038                         |                   | 0.0025                                  |                   |
| <b>PFS</b>            |                                |                   |   |                   |
| Hazard Ratio (IC 95%) | 0.85 (0.726, 0.998)            |                   | 0.68 (0.501, 0.934)                     |                   |
| Valeur de p           | 0.0479                         |                   | 0.0167                                  |                   |

IC = intervalle de confiance, FOLFIRI = irinotécan plus perfusion de 5-FU/AF, ORR = objective response rate, taux de réponses objectives (patients avec réponse complète ou réponse partielle), PFS = *progression-free survival time*, durée de survie sans progression

### **En association avec la capécitabine**

Les données d'une étude clinique de phase III (CAIRO) randomisée et contrôlée supportent l'utilisation de la capécitabine à la dose initiale de 1000 mg/m<sup>2</sup> pendant deux semaines toutes les trois semaines en association à l'irinotécan dans le traitement de première ligne de patients atteints de cancer colorectal métastatique. Huit-cent-vingt (820) patients ont été randomisés pour recevoir soit un traitement séquentiel (n=410), soit une association de traitement (n=410). Le traitement séquentiel se composait d'un traitement de première ligne par la capécitabine (1250 mg/m<sup>2</sup> deux fois par jour pendant 14 jours), de deuxième ligne par l'irinotécan (350 mg/m<sup>2</sup> au jour 1) et de troisième ligne par l'association de la capécitabine (1000 mg/m<sup>2</sup> deux fois par jour pendant 14 jours) à l'oxaliplatine (130 mg/m<sup>2</sup> au jour 1).

Le traitement en association se composait d'un traitement de première ligne par la capécitabine (1000 mg/m<sup>2</sup> deux fois par jour pendant 14 jours) associé à l'irinotécan (250 mg/m<sup>2</sup> au jour 1) (XELIRI) et de seconde ligne par la capécitabine (1000 mg/m<sup>2</sup> deux fois par jour pendant 14 jours) plus oxaliplatine (130 mg/m<sup>2</sup> au jour 1). Tous les cycles de traitement étaient administrés à intervalles de trois semaines.

En traitement de première ligne, la survie médiane sans progression dans la population en intention de traiter était de 5,8 mois (IC 95% 5,1 - 6,2 mois) pour la capécitabine en monothérapie et de 7,8 mois (IC 95% 7,0 - 8,3 mois; p=0,0002) pour XELIRI.

Les données issues d'une analyse intermédiaire d'une étude de phase II (AIO KRK 0604) multicentrique, randomisée et contrôlée supporte l'utilisation de la capécitabine à la posologie initiale de 800 mg/m<sup>2</sup> pendant deux semaines toutes les trois semaines en association à l'irinotécan et au bevacizumab dans le traitement de première ligne de patients atteints de cancer colorectal métastatique. 115 patients ont été randomisés pour recevoir la capécitabine associée à l'irinotécan (XELIRI) et au bevacizumab: capécitabine (800 mg/m<sup>2</sup> deux fois par jour pendant deux semaines suivies d'une période sans traitement de sept jours), irinotécan (200 mg/m<sup>2</sup> en perfusion de 30 minutes le jour 1 toutes les trois semaines) et bevacizumab (7,5 mg/kg en perfusion de 30 à 90 minutes le jour 1 toutes les trois semaines). Un total de 118 patients a été randomisé pour recevoir un traitement par capécitabine associée à l'oxaliplatine et au bevacizumab: capécitabine (1000 mg/m<sup>2</sup> deux fois par jour pendant deux semaines suivies d'une période sans traitement de sept jours), oxaliplatine (130 mg/m<sup>2</sup> en perfusion de deux heures au jour 1 toutes les trois semaines) et bevacizumab (7,5 mg/kg en perfusion de 30 à 90 minutes le jour 1 toutes les trois semaines). La survie sans progression à 6 mois dans la population en intention de traiter était de 80% (XELIRI plus

bevacizumab) versus 74% (XELOX plus bevacizumab). Le taux de réponse globale (réponses complète et partielle) était de 45% (XELOX plus bevacizumab) versus 47% (XELIRI plus bevacizumab).

### **En monothérapie dans le traitement de deuxième ligne du cancer colorectal métastatique :**

Des essais cliniques de phase II/III ont été conduits chez plus de 980 patients atteints d'un cancer colorectal métastatique en échec d'un traitement antérieur par 5FU et traités toutes les 3 semaines. L'efficacité antitumorale de l'irinotécan a été évaluée chez 765 patients en progression documentée sous 5FU à l'entrée dans l'essai.

|                                      | Phase III                          |                              |          |                       |              |          |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------|-----------------------|--------------|----------|
|                                      | irinotécan versus soins palliatifs |                              |          | irinotécan versus 5FU |              |          |
|                                      | irinotécan<br>n=183                | Soins<br>palliatifs<br>n= 90 | p        | irinotécan<br>n=127   | 5FU<br>n=129 | p        |
| Survie sans progression à 6 mois (%) | NA                                 | NA                           | --       | 33,5*                 | 26,7         | p=0,03   |
| Survie à 1 an (%)                    | 36,2*                              | 13,8                         | p=0,0001 | 44,8*                 | 32,4         | p=0,0351 |
| Survie médiane (mois)                | 9,2*                               | 6,5                          | p=0,0001 | 10,8*                 | 8,5          | p=0,0351 |

NA: Non Applicable

\*: différence statistiquement significative

Dans les essais de phase II, réalisés chez 455 patients traités par le schéma d'administration toutes les 3 semaines, la survie sans progression à 6 mois a été de 30% et la survie médiane de 9 mois. Le temps médian jusqu'à progression était de 18 semaines.

De plus, des essais de phase II, non comparatifs, ont été réalisés chez 304 patients traités avec un schéma d'administration hebdomadaire, dont 193 patients à la dose de 125 mg/m<sup>2</sup>, en perfusion intraveineuse de 90 minutes, 4 semaines consécutives suivies de 2 semaines de repos. Dans ces essais, le temps médian jusqu'à progression était de 17 semaines, et la survie médiane était de 10 mois. Un profil de tolérance similaire à celui du schéma toutes les 3 semaines a été observé avec le schéma hebdomadaire, chez les 193 patients ayant débuté le traitement à la dose de 125 mg/m<sup>2</sup>. Le délai médian d'apparition de la première selle liquide était de 11 jours.

### **En association avec le cétuximab après échec d'une chimiothérapie à base d'irinotécan**

Le cetuximab, en association avec l'irinotécan, a été étudié dans 2 études cliniques. Au total, 356 patients atteints d'un cancer colorectal métastatique exprimant l'EGFR, après échec récent d'un traitement cytotoxique à base d'irinotécan et ayant un indice de performance de Karnofsky d'au moins 60, mais dont la majorité avait un indice de performance de Karnofsky supérieur ou égal à 80, ont reçu l'association.

EMR 62 202-007: cette étude randomisée a comparé l'association du cetuximab et de l'irinotécan (218 patients) avec le cetuximab en monothérapie (111 patients).

IMCL CP02-9923: cette étude à un bras, ouverte, a étudié l'association chez 138 patients.

Les données d'efficacité générées par ces études sont résumées dans le tableau suivant :

| Etude                         | N   | ORR<br>n (%) | IC 95%     | DCR<br>n (%) | IC 95%     | PFS (mois) |          | OS (mois) |           |
|-------------------------------|-----|--------------|------------|--------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|
|                               |     |              |            |              |            | Médiane    | IC 95%   | Médiane   | IC 95%    |
| <b>Cétuximab + irinotécan</b> |     |              |            |              |            |            |          |           |           |
| EMR 62 202-007                | 218 | 50 (22,9)    | 17,5; 29,1 | 121 (55,5)   | 48,6; 62,2 | 4,1        | 2,8; 4,3 | 8,6       | 7,6; 9,6  |
| IMCL CP02-9923                | 138 | 21 (15,2)    | 9,7; 22,3  | 84 (60,9)    | 52,2; 69,1 | 2,9        | 2,6; 4,1 | 8,4       | 7,2; 10,3 |
| <b>Cétuximab</b>              |     |              |            |              |            |            |          |           |           |
| EMR 62 202-007                | 111 | 12 (10,8)    | 5,7; 18,1  | 36 (32,4)    | 23,9; 42,0 | 1,5        | 1,4; 2,0 | 6,9       | 5,6; 9,1  |

DCR = *disease control rate*, taux de contrôle de la maladie (patients avec réponse complète, réponse partielle ou stabilisation de la maladie pendant au moins 6 semaines), IC = intervalle de confiance, ORR = *objective response rate*, taux de réponses objectives (patients avec réponse complète ou réponse partielle), OS = *overall survival*, durée de survie globale, PFS = *progression-free survival time*, durée de survie sans progression

L'efficacité de l'association du cetuximab et de l'irinotécan était supérieure à celle du cetuximab en monothérapie en termes de taux de réponses objectives (ORR), de taux de contrôle de la maladie (DCR) et de survie sans progression (PFS). Dans l'essai clinique randomisé, aucun effet sur la durée de survie globale n'a été démontré (*Hazard ratio* 0,91;  $p = 0,48$ ).

#### Patients présentant une activité réduite de l'UGT1A1 :

L'UDP glucuronosyltransférase-1 polypeptide A1 (UGT1A1) est impliquée dans la désactivation métabolique du SN-38, le métabolite actif de l'irinotécan, en SN-38 glucuronide (SN-38G) inactif. Le gène UGT1A1 est extrêmement polymorphe, ce qui se traduit par des capacités métaboliques variables parmi les différents individus. L'une des variations spécifiques du gène UGT1A1 inclut un polymorphisme dans la région promotrice connue sous le nom de variant UGT1A1\*28. Ce variant et d'autres déficiences congénitales dans l'expression de l'UGT1A1 (telles que la maladie de Crigler-Najjar et le syndrome de Gilbert) sont associés à une activité réduite de cette enzyme. Les données d'une méta-analyse indiquent que les personnes atteintes du syndrome de Crigler-Najjar (de types 1 et 2) ou les personnes homozygotes pour l'allèle UGT1A1\*28 (syndrome de Gilbert) présentent un risque accru de toxicité hématologique (grades 3 et 4) après une administration d'irinotécan à des doses modérées ou élevées ( $> 150 \text{ mg/m}^2$ ). Aucun lien n'a été établi entre le génotype de l'UGT1A1 et la survenue de diarrhées induites par l'irinotécan.

Les patients connus pour être homozygotes pour l'UGT1A1\*28 doivent recevoir la dose initiale d'irinotécan normalement indiquée. Cependant, ces patients doivent faire l'objet d'une surveillance destinée à déceler d'éventuelles toxicités hématologiques. Envisager une dose initiale réduite d'irinotécan chez les patients ayant déjà fait l'expérience d'une toxicité hématologique avec un traitement antérieur. La diminution exacte de la dose initiale dans cette population de patients n'a pas été établie et les éventuelles modifications de dose ultérieures doivent être fondées sur la tolérance au traitement de chaque patient (voir rubriques « Posologie et mode d'administration » et « Mises en garde spéciales et précautions d'emploi »).

Les données sont actuellement insuffisantes pour conclure sur l'utilité clinique du génotypage de l'UGT1A1.

## **Propriétés pharmacocinétiques**

### **Absorption**

Les moyennes des concentrations des pics plasmatiques de l'irinotécan et du SN-38, obtenues à la fin de la perfusion, à la dose recommandée de  $350 \text{ mg/m}^2$  étaient respectivement de  $7,7 \text{ } \mu\text{g/ml}$  et  $56 \text{ ng/ml}$ , et les valeurs moyennes de l'aire sous la courbe (ASC) étaient respectivement de  $34 \text{ } \mu\text{g.h/ml}$  et  $451 \text{ ng.h/ml}$ . Une large variabilité interindividuelle des paramètres pharmacocinétiques est observée principalement pour le métabolite SN-38.

### **Distribution**

Au cours d'une étude de phase I menée chez 60 patients traités avec un schéma d'administration recommandé (perfusion intraveineuse de 30 minutes à raison de  $100$  à  $750 \text{ mg/m}^2$ , toutes les 3 semaines), le volume de distribution à l'état d'équilibre (Vss) était de  $157 \text{ l/m}^2$ .

In vitro, la liaison aux protéines plasmatiques était d'environ 65 % pour l'irinotécan et de 95 % pour le SN-38.

### **Biotransformation**

L'équilibre de masse et les études de métabolisme avec le médicament marqué au carbone 14 ont montré que plus de 50 % de la dose d'irinotécan administrée par voie intraveineuse est excrétée sous forme inchangée, dont 33 % principalement dans les fèces via la bile et 22 % dans les urines.

Deux voies métabolisent, chacune, au moins 12 % de la dose :

- l'hydrolyse par carboxylestérase avec formation du métabolite actif, le SN-38, qui est principalement éliminé par glucuronidation, puis par excrétion biliaire et rénale (moins de 0,5 % de la dose d'irinotécan).  
Le SN-38 glucuronidé est par la suite probablement hydrolysé dans l'intestin.
- L'oxydation dépendante du cytochrome P450 3A, aboutissant à l'ouverture extérieure du noyau pipéridine avec la formation d'APC (le dérivé de l'acide aminopentanoïque) et de NPC (le dérivé

de l'amine primaire) (voir rubrique « Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions »).

L'irinotécan inchangé est l'entité principale dans le plasma, suivi par l'APC, le SN-38 glucuronidé et le SN-38. Seul le SN-38 possède une activité cytotoxique significative.

### **Élimination**

Au cours d'une étude de phase I menée chez 60 patients traités avec le schéma d'administration recommandé (perfusion intraveineuse de 30 minutes à raison de 100 à 750 mg/m<sup>2</sup> toutes les 3 semaines), l'irinotécan a montré un profil d'élimination biphasique ou triphasique.

La clairance plasmatique moyenne était de 15 l/h/m<sup>2</sup>. La demi-vie plasmatique moyenne de la première phase, du modèle triphasique, était de 12 minutes, celle de la seconde phase était de 2,5 heures et la demi-vie terminale de 14,2 heures.

Le SN-38 a montré un profil d'élimination biphasique avec une demi-vie d'élimination terminale moyenne de 13,8 heures.

La clairance de l'irinotécan est diminuée d'environ 40 % chez les patients ayant une bilirubinémie comprise entre 1,5 et 3 fois la limite supérieure de la normale. Chez ces patients, la posologie de 200 mg/m<sup>2</sup> d'irinotécan entraîne une exposition plasmatique comparable à celle observée chez les patients ayant des paramètres hépatiques normaux et recevant la posologie de 350 mg/m<sup>2</sup>.

### **Linéarité/non-linéarité**

Une analyse pharmacocinétique de population de l'irinotécan a été réalisée, chez 148 patients atteints d'un cancer colorectal métastatique et traités avec des doses et des schémas d'administration différents, au cours d'essais de phase II. Les paramètres pharmacocinétiques estimés avec un modèle à trois compartiments étaient semblables à ceux observés dans l'étude de phase I. Toutes les études ont montré que l'exposition à l'irinotécan (CPT-11) et au SN-38 augmente proportionnellement avec la dose administrée de CPT-11 ; la pharmacocinétique est indépendante du nombre de cycles administrés et du schéma d'administration.

### **Relation(s) pharmacocinétique/pharmacodynamique**

L'intensité des toxicités majeures rencontrées avec l'irinotécan (par ex., leuconéutropénie et diarrhée) est en rapport avec l'exposition (ASC) à la molécule-mère et au métabolite SN-38. Des corrélations significatives ont été observées entre la toxicité hématologique (diminution du taux des globules blancs et des polynucléaires neutrophiles au nadir) ou l'intensité de la diarrhée et les valeurs des aires sous la courbe (ASC) de l'irinotécan et de son métabolite SN-38 en monothérapie.

### **Données de sécurité préclinique**

L'irinotécan et le SN-38 se sont révélés mutagènes dans le test d'aberration chromosomique *in vitro* dans les cellules CHO ainsi que dans le test du micronoyau *in vivo* chez la souris.

Toutefois, aucun effet mutagène de ces substances n'a été mis en évidence dans le test d'Ames.

Chez les rats traités une fois par semaine pendant 13 semaines à la dose maximale de 150 mg/m<sup>2</sup> (dose qui est moins de la moitié de la dose recommandée chez l'Homme), aucune tumeur imputable au traitement n'a été rapportée 91 semaines après la fin du traitement. Des études de toxicité à dose unique ou répétée avec l'irinotécan ont été réalisées chez la souris, le rat et le chien. Les principaux effets toxiques ont été relevés dans les systèmes hématopoïétiques et lymphatiques.

Chez le chien, une diarrhée tardive associée à une atrophie et une nécrose localisée de la muqueuse intestinale a été rapportée.

Une alopecie a également été observée chez le chien.

La sévérité de ces effets était dose-dépendante et réversible.

### **Reproduction**

L'irinotécan a montré des effets tératogènes chez le rat et le lapin à des doses inférieures à la dose thérapeutique administrée chez l'homme. Chez le rat, les petits, nés d'animaux traités, ayant des anomalies externes ont montré une diminution de la fertilité. Cela n'a pas été relevé chez les petits morphologiquement normaux. Chez les rates pleines, une diminution du poids du placenta ainsi

qu'une diminution de la viabilité fœtale et une augmentation des anomalies de comportement de la progéniture ont été notés.

## **DONNEES PHARMACEUTIQUES**

### **Liste des excipients**

Acide lactique, sorbitol E420, hydroxyde de sodium, acide chlorhydrique, eau pour préparations injectables.

### **Incompatibilités**

En l'absence d'études de compatibilité, ce médicament ne doit pas être mélangé avec d'autres médicaments.

### **Durée de conservation**

2 ans.

### **Précautions particulières de conservation**

Pour les présentations de 2 ml, 5 ml et 15 ml : À conserver à une température ne dépassant pas 25°C. À l'abri de la lumière.

Pour la présentation de 25 ml : À conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

#### Après ouverture :

D'un point de vue microbiologique, la solution pour perfusion doit être utilisée immédiatement. En cas d'utilisation non immédiate, les durées et conditions de conservation avant utilisation relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur et ne devraient pas dépasser 24 heures à une température comprise entre 2°C et 8°C.

### **Nature et contenu de l'emballage extérieur**

Flacon de 2 ml (verre brun de type I) avec un bouchon en caoutchouc chlorobutyle et une capsule (type flip off). Boîte de 1 flacon.

Flacon de 5 ml (verre brun de type I) avec un bouchon en caoutchouc chlorobutyle et une capsule (type flip off). Boîte de 1 flacon.

Flacon de 15 ml (verre brun de type I) avec un bouchon en caoutchouc chlorobutyle et une capsule (type flip off). Boîte de 1 flacon.

Flacon de 25 ml (verre brun de type I) avec un bouchon en caoutchouc chlorobutyle et une capsule (type flip off). Boîte de 1 flacon.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

### **Précautions particulières d'élimination et de manipulation**

Comme tous les agents antinéoplasiques, l'irinotécan doit être préparé et manipulé avec précaution. Il est indispensable d'utiliser des lunettes de protection, un masque et des gants.

En cas de contact cutané avec la solution à diluer ou la solution à perfuser, il convient d'éliminer immédiatement et soigneusement le produit à l'eau et au savon. En cas de contact d'une muqueuse avec la solution à diluer ou la solution à perfuser, celle-ci doit être lavée immédiatement à grande eau.

#### **Préparation de la solution à perfuser**

Comme tous les autres médicaments utilisés par voie injectable, la solution d'IRINOTÉCAN FRESENIUS POUR PERFUSION DOIT ETRE PREPAREE DE FACON ASEPTIQUE (voir rubrique « Précautions particulières de conservation »).

En cas de présence de précipité dans les flacons ou dans la solution diluée, le produit doit être jeté selon les procédures classiques de traitement des déchets cytotoxiques.

A l'aide d'une seringue graduée, prélever dans le flacon la quantité voulue de la solution d'irinotécan en veillant à respecter les conditions d'asepsie et l'injecter dans une poche ou un flacon de perfusion de 250 ml contenant soit une solution de chlorure de sodium à 0,9%, soit une solution glucosée à 5%. Mélanger soigneusement la solution à perfuser par rotation manuelle.

### **Elimination des déchets**

Tout médicament non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

## **TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

**FRESENIUS KABI FRANCE**  
5, PLACE DU MARIVEL  
92310 SEVRES

## **NUMERO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

- 34009 574 894 4 1 : flacon de 2 ml (verre). Boîte de 1.
- 34009 574 895 0 2 : flacon de 5 ml (verre). Boîte de 1.
- 34009 582 465 1 7 : flacon de 15 ml (verre). Boîte de 1.
- 34009 576 940 3 6 : flacon de 25 ml (verre). Boîte de 1.

Liste I.

Médicament soumis à prescription hospitalière. Prescription réservée aux spécialistes en oncologie ou en hématologie ou aux médecins compétents en cancérologie. Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement.

Agrément collectivités.

## **DATE DE PREMIERE AUTORISATION/DE RENOUELEMENT DE L'AUTORISATION**

03/04/2009

## **DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE**

18/09/2018